

**IT** Formula elementare in polvere, nutrizionalmente completa, a base di aminoacidi liberi di sintesi. Ipoallergenico. Per il trattamento nutrizionale di bambini con: allergia alle proteine del latte vaccino, intolleranze multiple alle proteine alimentari, altre indicazioni per cui sia raccomandata una dieta elementare. **Alimento a fini medici speciali.**

**Avvertenze importanti:** Solo per uso enterale. Non somministrare per via parenterale. Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Non adatto a bambini di età inferiore ad 1 anno. Adatto ad essere utilizzato come unica fonte di nutrizione o come integrazione alla dieta del paziente.

**Conservazione:** Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere sempre il barattolo dopo l'uso. Una volta aperto, consumare entro un mese. Confezionato in atmosfera protettiva.

Prodotto nel Regno Unito da SHS International Ltd.  
Distribuito da: Nutricia Italia SpA, via C. Farini 41, 20159 Milano. Per informazioni: 800-822096 – www.nutricia.it.  
Notificato al Min.Sal. ai sensi del DPR 57 del 20/03/02

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi base barattolo.

**GR** Θεραπευτική πλήρης προϊόν σε μορφή σκόνης με βάση τα ελεύθερα αμινοξέα. Υποαλλεργικό. Για την διατηρητική διαχείριση παιδιών με: αλλεργία στο γάλα αγελάδας, πολυπροφικές αλλεργίες, άλλες παθήσεις όπου ενδείκνυται η στοιχειακή διατροφή. **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.**

**Σημαντική σημείωση:** Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Δεν είναι κατάλληλο για βρέφη ηλικίας κάτω του 1 έτους. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή σίτισης ή συμπληρωματικό στην διατροφή του ασθενούς.

**Αποθήκευση:** Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Πάντα να επαναποθετείτε το καπάκι στο κουτί μετά τη χρήση.

Μετά το άνοιγμα μπορεί να καταναλωθεί εντός 1 μήνα. Συσκευάζεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα

Παράγεται από την SHS International Ltd.

Nutril Hellas A.E. - Παράδραμος 17 γλυ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία & Καλαμάτας 2 - 14564 Ν. Κηφισιά -

Τηλ 210 6248547 - Γραμμή φροντίδας 8001168600 χωρίς χρέωση www.nutricia-medical.gr

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 43572 - 25/03/2016

Ανάλογη πριν από: Βλέπετε το κάτω μέρος της συσκευασίας.

**NUTRICIA**  
**neocate**  
Junior  
400 g e

**CZ** Nutričné kompletní výživa na bázi aminokyselin, v prášku. Hypoalergenní. Pro řízenou dietní výživu dětí při alergii na bílkovinu kravského mléka, vícenásobné intoleranci bílkovin v potravinách či jiných indikacích vyžadujících elementární stravu. **Potravina pro zvláštní lékařské účely.**

**Důležitá upozornění:** Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné pro kojence do 1 roku. Vhodný jako jediný zdroj výživy nebo k doplnění stravy pacienta.

**Skladování:** Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Obsah plechovky spotřebujte do 1 měsíce po otevření. Baleno v ochranné atmosféře.

Výrobce: SHS International Ltd., Velká Británie  
Kontakt pro ČR: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001, www.neocate.cz

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

**SK** Nutričné kompletná výživa na báze aminokyselin, v prášku. Hypoalergénna. Na diétny režim pri alergií na bielkovinu kravského mlieka, viacsobnej intolerancii bielkovin v potravinách alebo iných indikáciách vyžadujúcich elementárnu stravu. **Potravina na osobitné lekárske účely.**

**Dôležité upozornenia:** Len na enterálne použitie. Nie je určené na parenterálne použitie. Používať len pod lekárskeym dohľadom. Nie je vhodný pre dojčatá do 1 roku veku. Vhodný ako jediný zdroj výživy alebo na doplnenie stravy pacienta.

**Skladovanie:** Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po každom použití plechovku dobre uzatvorte. Obsah plechovky spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení. Balené v ochranné atmosfére.

Výrobca: SHS International Ltd., Veľká Británia

Kontakt pre SR: Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SR. Infolinka: 0800 444 006, www.neocate.sk

Minimálna trvanlivosť do: vid' dno plechovky.



10327172  
129772



5 016533 652673

**NUTRICIA**  
**neocate**  
Junior

1+



Gusto neutro  
Oυδέτερη Γεύση  
bez příchutě  
bez příchute  
400 g e

**IT** **Dosaggio consigliato:** La quantità di formula e la diluizione dovrebbero essere determinate dal medico, e dipendono dall'età, dal peso e dalle condizioni cliniche del paziente.

**Diluizione raccomandata:** La diluizione raccomandata del prodotto è 21,1% p/v (1 kcal/ml) - per ottenere questa diluizione, aggiungere 1 misurino raso di polvere ogni 30 ml di acqua. Un misurino raso fornisce 7,3 g di polvere.

**Preparazione:** Lavarsi le mani, utilizzare utensili puliti. Misurare la quantità di acqua raccomandata in un contenitore. Aggiungere all'acqua la quantità di polvere prescritta. Utilizzare solo il misurino fornito. Coprire e agitare il contenitore finché la polvere non è dissolta. Una volta ricostituito, conservare in frigorifero e consumare entro 24h. Mescolare o agitare immediatamente prima dell'uso. Se somministrato per via orale, è più gradevole servito fresco. Note: Non far bollire la formula ricostituita. Non usare il microonde per preparare o riscaldare la formula.


**Conservazione:** Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere sempre il barattolo dopo l'uso. Una volta aperto, consumare entro un mese. Confezionato in atmosfera protettiva.

**Ingredienti:** sciroppo di glucosio disidratato, oli vegetali raffinati (trigliceridi a media catena (olio di palma e/o di cocco), olio di girasole ad alto contenuto di acido oleico, olio di colza, olio di girasole), L-serina, L-glutammina, maltodestrine, glicina, L-alanina, L-leucina, acetato di L-isina, L-treonina, citrato di tripalmitato, L-tirosina, emulsionante (E472c), L-valina, L-isoleucina, fosfato di calcio bibasico, cloruro di magnesio, L-prolina, idrogenofosfato di disodio, carbonato di calcio, L-cistina, L-cistidina, L-fenilalanina, idrogenofosfato di dipotassio, L-metionina, L-arginina, cloruro di sodio, bitartrato di colina, L-triptofano, citrato di tricalcio, acido L-ascorbico, cloruro di calcio, antiossidanti (lecitina di girasole, ascorbil palmitato), taurina, M-inositolo, solfato ferroso, L-camitina, solfato di zinco, acetato di DL-α-tocofenolo, nicotinamide, calcio D-pantotenato, solfato di rame, riboflavina, solfato di manganese, idrocloruro di tiamina, idrocloruro di piridossina, acetato di vitamina A, ioduro di potassio, acido folico, molibdato di sodio, cloruro di cromo, selenio di sodio, fitomenadione, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.

**GR** **Προτεινόμενη Δοσολογία:** Η ποσότητα της τροφής και της αραιώσης θα πρέπει να καθορίζεται από κλινικό ιατρό ή

διατολόγο μόνο, και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς. **Συστήσιμην συγκέντρωση:** Η προτεινόμενη αραιώση είναι 21,1% βάρος κατά όγκο (kcal/ml) - για την επίτευξη αυτής της αραιώσης προσθέστε μία μεζούρα προϊόντος σε 30ml νερό. Μία μεζούρα παρέχει 7,3g σκόνης. **Προετοιμασία:** Πλύντε τα χέρια σας και καθαρίστε όλα τα σκεύη. Βάλτε την ενδεικνυόμενη ποσότητα νερού σε ένα μπιρλι ή ένα μπιρρό. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα προϊόντος στο νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μεζούρα. Κλείστε το μπιρρό και ανακινήστε το προϊόν μέχρι να διαλυθεί η σκόνη. Μετά την αναούλευση, φυλάσσετε στο ψυγείο και μπορεί να καταναλωθεί εντός 24 ωρών. Ανακινήστε καλά άμεσα πριν την κατανάλωση. Εάν χορηγείται από το στόμα, καταναλώνεται καλύτερα δροσερά. Σημείωση: Μην βράζετε την παρασκευασμένη τροφή. Μην χρησιμοποιείτε τον φούorno μικροκυμάτων για την παρασκευή ή το ζεσταμα της τροφής. **Αποθήκευση:** Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος. Πάντα να επαναποθετείτε το καπάκι στο κουτί μετά τη χρήση. Μετά το άνοιγμα μπορεί να καταναλωθεί εντός 1 μήνα. Συσκευάζεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα. **Συστατικά:** αποξηραμένο σιρόπι γλυκόζης, εξεξηνωμένα φυτικά έλαια (τριγλυκερίδια μεσαίας αλυσού (βιονικωπυρηνέλαιου ή και έλαιου κοράδου), ηλιέλαιο υψηλού ελαϊκού, έλαιο κανόλι, ηλιέλαιο), L-Σερίνη, L-Γλουταμίνη, μαλτοδεξτρίνη γλυκίνη, L-Αλανίνη, L-Λευκίνη, οξική L-Λυσίνη, L-Θρεονίνη, τριπικό κολό, L-Τυροσίνη, γαλακταμωποστητής (E472c), L-Βαλλίνη, L-Ισολευκίνη, δισοακό φωσφορικό ασβέστο, γλυκωλύο μαγνήσιο, L-Προλίνη, μονόαίνο φωσφορικό ασβέστο, ανόργανο ασβέστο, L-Κυστίνη, L-Ιστιδίνη, L-Φαινυλοαλανίνη, διοξείνιο φωσφορικό κάλιο, L-Μεθειονίνη, L-Αργινίνη, γλυκωλύο νάτριο, διπτυκική γαλίνη, L-Τρυπτοφάνη, κτρικό ασβέστο, L-Ασκορβικό οξύ, γλυκωλύο ασβέστο, αντιοξειδωτικά (ασκίνη ηλιελαίου, πολυμικό σιακαβύλο), ταυρίνη, M-ινωσιτόλ, θειακό σίδηρος, L-Κορμίνη, θειακό μευδόμενος, οξική DL-α-τοκοφερόλη, νικωτιαμίδιο, D-παντοθενικό ασβέστο, θειακό χαλκό, βιβαφοβήλη, θειακό μαγνήσιο, υδροχλωρική θουαμίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, Βιταμίνη Α, ιωδογόο κάλιο, φυλικό οξύ, μολιβδαιικό νάτριο, γλυκωλύο χρώμιο, σεληνιόδεξ νάτριο, φυτομενωδίνη, D-βιοτίνη, γαλνικολισφερόλη, κυανωκοβαλαμίνη.

**CZ** **Doporučený příjem:** Množství a ředění výživy určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta. **Doporučená koncentrace výživy:** Doporučená koncentrace výživy je 21,1% (1 kcal/ml) - k dosažení této koncentrace přidejte 1 zaručenou odměrku na každých 30 ml vody. 1 zaručená odměrka obsahuje 7,3 g prášku. **Příprava:** Umyjte si důkladně ruce a použijte čisté nádoby. Doporučené množství vody odměřte do nádoby. Do vody přidejte předepsané množství prášku. Použijte pouze přiložený odměrku. Nádobu uzavřete a obsah důkladně protřepejte, dokud se prášek zcela nerozpustí. Připravenou výživu uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin od přípravy. Bezprostředně před použitím výživu protřepejte nebo zamíchejte. Pro perorální podání - výrobek nejlépe chutná vychlazený. **Upozornění:** Připravenou výživu nepřeváříjte. K přípravě či ohívání výživy nepoužívejte mikrovlnnou troubu. **Skladování:** Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Obsah plechovky spotřebujte do 1 měsíce po otevření. Baleno v ochranné atmosféře. **Složení:** sušený glukózový sirup, rafinované rostlinné oleje (triglyceridy se středním řetězcem (palmojádřový a/ nebo kokosový olej), slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, řepkový, slunečnicový), L-serin, L-glutamin, maltodextrin, glycin, L-alanin, L-leucin, L-lysin acetát, L-threonin, citran tridraselný, L-tyrosin, emulgátor (E472c), L-valin, L-isoleucin, hydrogentosforečnan vápenatý, chlorid horečnatý, L-prolin, hydrogentosforečnan disodný, uhličitan vápenatý, L-cystin, L-histidin, L-fenyloalanin, hydrogentosforečnan didraselný, L-methionin, L-arginin, chlorid sodný, cholin bitartrát, L-tryptofan, citran trivápenatý, kyselina L-askorbová, chlorid vápenatý, antioxidanty (slunečnicový lecitin, askorbylpalmitát), taurin, M-inozitol, siran železnatý, L-kamitin, siran zinečnatý, DL-α-tokoferyl-acetát, nikotinamid, D-pantothénat vápenatý, siran měďnatý, riboflavin, siran manganatý, thiamin hydrochlorid, D-pantothén hydrochlorid, retinyl-acetát, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamátová, molybdenan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, fytomenadion, D-biotin, cholecalciferol, kyanokobalamin.



Misurini/Μεζούρες/Odměrky/Odmerky	Acqua/Νερό/Voda/Voda (ml)	Volume approssimativo totale/Συνολικός συνολικός όγκος/Πřibližný celkový objem/Пřibližný celkový objem (ml)
1 (7,3 g)	30	35
3 (21,9 g)	90	105
10 (73 g)	300	350

10327172

Informazioni nutrizionali per/ Διατροφικές Πληροφορίες ανά/ Nutriční informace na/ Výživné údaje na

100 g di polvere/100 gr σκόνης/100 g prášku:	100 ml*/100 ml*:	100 g di polvere/100 gr σκόνης/100 g prášku:	100 ml*/100 ml*:		
<b>Energia/Ενέργεια/Energetická hodnota</b>	1992 kJ 475 kcal	420 kJ 100 kcal	Vit. Βe/Βit. Βe Acido folico/Φυλλικό οξύ/Kyselina listová	0,48 mg 71,3 µg	0,10 mg 15,0 µg
<b>Grassi/Λίπη/Tuky (42 Er%)</b>	22,0 g	4,6 g	Vit. Βse/Βit. Βse Biotina/Biotinyl/Biotin/Biotin	1,2 µg 14,3 µg	0,25 µg 3,0 µg
- Acidi grassi saturi/Κορεσμένα/Nasyčené mastné kyseliny/ Nасытєné mastné kyseliny	9,4 g	2,0 g	Vit. C/Βit. C	47,5 mg	10,0 mg
- Acidi grassi monoinsaturi/Μονοακόρεστα/ Mononenasyčené mastné kyseliny/Mononenasyтєné mastné kyseliny	7,7 g	1,6 g	<b>Minerali e Oligoelementi/Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία/ Minerální látky a stopové prvky/Minerálne látky a stopové prvky</b>		
- Acidi grassi polinsaturi/Τολυακόρεστα/ Polynenasyčené mastné kyseliny/Polyenasyтєné mastné kyseliny	4,0 g	0,84 g	Na	285 mg	60,1 mg
<b>Carboidrati/Υδατάνθρακες/Sacharidy (47 Er%)</b>	56,0 g	11,8 g	K	546 mg	115 mg
di cui/ek των οποίων/z toho			Cl	437 mg	92,2 mg
- Zuccheri/Ζάχαρα/Cukry	5,0 g	1,1 g	Ca	428 mg	90,3 mg
<b>Fibre/Εδώδημας/Ίνες/Vláknina (0 Er%)</b>	0 g	0 g	Mg	309 mg	65,2 mg
<b>Proteine equivalenti/Ισοδύναμο πρωτεΐνης/Bilkoviny (ekvivalenti/ Bielkoviny (ekvivalenti) (11 Er%))</b>	13,3 g	2,8 g	P	66,5 mg	14,0 mg
<b>Sale/Άλας/Sůl/Soľ</b>	0,71 g	0,15 g	Fe	5,7 mg	1,2 mg
<b>Vitamine/Βιταμίνες/Vitaminy/Vitamins</b>			Zn	5,2 mg	1,1 mg
Vit. A/Βit. A	214 µg	45,2 µg	Cu	0,48 mg	0,10 mg
Vit. D/Βit. D	6,2 µg	1,3 µg	Mn	0,29 mg	0,06 mg
Vit. E/Βit. E	6,7 mg (α-TE/ET)	1,4 mg (α-TE/ET)	Mo	21,4 µg	4,5 µg
Vit. K/Βit. K	19,0 µg	4,0 µg	Se	15,2 µg	3,2 µg
Tiamina/Θιαμίνη/Thiamin/Tiamin	0,48 mg	0,10 mg	Cr	7,6 µg	1,6 µg
Riboflavina/Ριβοφλοβίνη/Riboflavin/Riboflavin	0,95 mg	0,20 mg	I	71,3 µg	15,0 µg
Niacina/Νιασίνη/Niacin/Niacin	(9,0 mg NE/EN)	5,3 mg			
Acido pantotenico/Παντοθενικό Οξύ/ Kyselina pantothénová/Kyselina pantoténová	1,9 mg	0,40 mg	<b>Άλtri/Άομά/Jině/Jiné</b>		
			Colina/Χολίνη/Cholin/Cholin	95,0 mg	20,0 mg
			Inositolo/Ινοσιτόλη/Inositol/Inozitol	26,1 mg	5,5 mg
			L-Camitina/L-Κορμίνη/L-kamitin/L-kamitin	15,80 mg	3,3 mg
			Taurina/Τουρίνη/Taurin/Taurin	31,45 mg	6,6 mg
			Osmolalità/Όσμωτικότητα/Osmolalita		600 mOsmol/kg H <sub>2</sub> O

\*Alla concentrazione raccomandata del 21,1%\*/ Στην προτεινόμενη αραιώση 21,1%\*/ Při doporučené koncentraci 21,1 %\*/ При odporúčanєй koncentracii 21,1 %

**NUTRICIA**  
**neocate**  
Junior

10327172



**IT** Formula elementare in polvere, nutrizionalmente completa, a base di aminoacidi liberi di sintesi. Ipoallergenico. Per il trattamento nutrizionale di bambini con: allergia alle proteine del latte vaccino, intolleranze multiple alle proteine alimentari, altre indicazioni per cui sia raccomandata una dieta elementare. **Alimento a fini medici speciali.** Contiene zuccheri ed edulcorante.

**Avvertenze importanti:** Solo per uso enterale. Non somministrare per via parenterale. Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Non adatto a bambini di età inferiore ad 1 anno. Adatto ad essere utilizzato come unica fonte di nutrizione o come integrazione alla dieta del paziente.

**Indicazioni per l'uso:** Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere sempre il barattolo dopo l'uso. Una volta aperto, consumare entro un mese. Confezionato in atmosfera protettiva.

Prodotto nel Regno Unito da SHS International Ltd. Distribuito da: Nutricia Italia SpA, via C. Farini 41, 20159 Milano. Per informazioni: 800-822096 – www.nutricia.it. Notificato al Min.Sal. ai sensi del DPR 57 del 20/03/02

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi base barattolo.

**GR** Θεωρητικά πλήρως προϊόν σε μορφή σκόνης με βάση τα ελεύθερα αμινοξέα. Υποαλλεργικό. Για την διατροφική διαχείριση παιδιών με: αλλεργία στο γάλα αγελάδας, πολυτροφικές αλλεργίες, άλλες παθήσεις όπου ενδείκνυται η στοιχειώκη διατροφή. **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.** Με σάκχαρα και γλυκαντικές ουσίες.

**Σημαντική σημείωση:** Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Δεν είναι κατάλληλο για βρέφη ηλικίας κάτω του 1 έτους. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή σίτησης ή συμπληρωματικά στην διατροφή του ασθενούς.

**Οδηγίες χρήσης:** Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Πάντα να επαναποτηθετείτε το καπάκι στο κουτί μετά τη χρήση. Μετά το άνοιγμα μπορεί να καταναλωθεί εντός 1 μήνα. Συσκευάζεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα

Παράγεται από την SHS International Ltd. Numil Hellas A.E. - Παράδρομος 17 γλυ Εθνικής Οδού Αθηνών /Λαμίας & Κολαμάτας 2 - 14564 Ν. Κηφισιά - Τηλ 210 6248547 - Γραμμή φροντίδας 8001168600 χωρίς χρέωση www.nutricia-medical.gr Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 43572-25/05/2016

Ανάλογη πριν από: Βλέπετε το κάτω μέρος της συσκευασίας.

**NUTRICIA**  
**neocate**<sup>®</sup>  
**Junior**  
**400 g e**

**CZ** Nutričně kompletní výživa na bázi aminokyselin, v prášku. Hypoalergenní. Pro řízenou dietní výživu dětí při alergi na bílkovinu kravského mléka, vícenásobné intoleranci bílkovin v potravinách či jiných indikacích vyžadujících elementární stravu. **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** S cukry a sladidlem.

**Důležité upozornění:** Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné pro kojence do 1 roku. Vhodné jako jediný zdroj výživy nebo k doplnění stravy pacienta.

**Návod k použití:** Skladujte na suchém a chladném místě. Před použitím si přečtěte další informace uvedené v příloženém letáku. Baleno v ochranné atmosféře.

Výrobce: SHS International Ltd., Velká Británie  
Kontakt pro ČR: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001, www.neocate.cz

Minimální trvanlivost: viz dno plechovky.

**SK** Nutrične kompletná výživa na báze aminokyselín, v prášku. Hypoalergénna. Na diétny režim detí pri alergi na bielkovinu kravského mlieka, viacnásobnej intolerancii bielkovín v potravinách alebo iných indikáciách vyžadujúcich elementárnu stravu. **Potravina na osobitné lekárske účely.** Obsahuje cukry a sladidlo.

**Dôležité upozornenia:** Len na enterálne použitie. Nie je určené na parenterálne použitie. Používajte len pod lekárskm dohľadom. Nevhodné pre dojčatá do 1 roku veku. Vhodné ako jediný zdroj výživy alebo na doplnenie stravy pacienta.

**Návod na použitie:** Skladujte na suchom a chladnom mieste. Pred použitím si prečítajte ďalšie informácie uvedené v priloženom letáku. Balené v ochrannej atmosfére.

Výrobca: SHS International Ltd., Veľká Británia  
Kontakt pre SR: Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SR. Infolinka: 0800 444 006, www.neocate.sk

Minimálna trvanlivosť do: vid' dno plechovky.



**NUTRICIA**  
**neocate**<sup>®</sup>  
**Junior**

**1+**



**Gusto vaniglia  
Γεύση Βανίλια  
s příchutí vanilkovou  
s vanilkovou příchutíou**  
**400 g e**

**IT** **Dosaggio consigliato:** La quantità di formula e la diluizione dovrebbero essere determinate dal medico, e dipendono dall'età, dal peso e dalle condizioni cliniche del paziente. La diluizione raccomandata del prodotto è 21,1% p/v (1 kcal/ml) - per ottenere questa diluizione, aggiungere 1 misurino raso di polvere ogni 30 ml di acqua. Un misurino raso fornisce 7,3 g di polvere.

**Preparazione:** Lavarsi le mani, utilizzare utensili puliti. Misurare la quantità di acqua raccomandata in un contenitore. Aggiungere all'acqua la quantità di polvere prescritta. Utilizzare solo il misurino fornito. Coprire e agitare il prodotto finché la polvere non è dissolta. Una volta ricostituito, conservare in frigorifero e consumare entro 24h. Mescolare o agitare immediatamente prima dell'uso. Se somministrato per via orale, è più gradevole servito fresco. Nota: Non far bollire la formula ricostituita. Non usare il microonde per preparare o riscaldare la formula.

**Ingredienti:** scioppo di glucosio disidratato, oli vegetali raffinati (trigliceridi a media catena (olio di palma e/o di cocco), girasole ad alto contenuto di acido oleico, canola, girasole), L-serina, L-glutammina, maltodestrina, glicina, L-alanina, L-leucina, acetato di L-isina, L-treonina, citrato di tripalossio, L-tirosina, aroma, emulsionante (E472c), L-valina, L-isoleucina, fosfato di calcio bibasico, cloruro di magnesio, L-prolina, idrogenofostato di disodio, carbonato di calcio, L-cistina, L-isitidina, L-fenilalanina, diidrogenofostato di potassio, L-metionina, L-arginina, cloruro di sodio, bitartrato di colina, L-triptofano, citrato di tricalcio, acido L-ascorbico, cloruro di calcio, antiossidanti (lecitina di girasole, ascorbii palmitato), taurina, M-inositolo, edulcorante (sucralosio), solfato ferroso, L-camitina, solfato di zinco, acetato di DL-α-tocofetolo, nicotinamide, calcio D-pantotenato, solfato di rame, riboflavina, solfato di manganese, idrocloruro di timamina, idrocloruro di piridossina, acetato di vitamina A, ioduro di potassio, acido iolico, molibdato di sodio, cloruro di cromo, selenito di sodio, fitomenadione, D-biotina, cocalciferolo, cianocobalamina.

**GR** **Προτεινόμενη Δοσολογία:** Η ποσότητα της τροφής και της αραίωσης θα πρέπει να καθορίζεται από κλινικό ιατρό ή διατολόγο μόνο, και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς. Η προτεινόμενη αραίωση είναι 21,1% βάρος κατ' όγκο (1kcal/ml) - για την επίτευξη αυτής της αραίωσης προσθέστε μία μεζούρα προϊόντος σε 30ml νερό. Μία μεζούρα παρέχει 7,3g σκόνης. **Προετοιμασία:** Πλύνετε τα χέρια σας και καθαρίστε όλα τα σκεύη. Βάλτε την ενδεικνυόμενη ποσότητα νερού σε ένα ποτήρι ή ένα μπιμπερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος στο νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μεζούρα. Κλείστε το μπιμπερό και ανακινήστε το προϊόν μέχρι να διαλυθεί η σκόνη. Μετά την ανασύσταση, φυλάσσεται στο ψυγείο και μπορεί να καταναλωθεί εντός 24 ωρών. Ανακινήστε καλά άμεσα πριν την κατανάλωση. Εάν χορηγείται από το στόμα, καταναλώνεται καλύτερα δροσερό. Σημείωση: Μην βράζετε την παρασκευασμένη τροφή. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για την παρασκευή ή το ζεσταμα της τροφής.

**Συστατικά:** αποξηραμένο σπρώπι γλυκόζη, εξυγνευμένα φυτικά έλαια (τριγλυκερίδια μεσοκίς αλίουου (φοινικιακωρηλέιου ή και ελαίου κορύδαας), ηλέκαιο λιπηλού ελαίκου, έλαιο κανόλια, ηλέκαιο), L-Σερίνη, L-Γλουταμίνη, μαλτοδεξτρίνη, γλυκίνη, L-Αλανίνη, L-Λευκίνη, οξική L-Λυσίνη, L-Θρεονίνη, τριπικό κάλιο, L-Τυροσίνη, άραμα, γαλακτωματοποιητής (E472c), L-Βαλίνη, L-Ισολευκίνη, διβασικό φωσφορικό σάβστο, γλυκωύχο μονγγήσιο, L-Προλίνη, μονόηνο φωσφορικό νάτριο, ανθρακικό σάβστο, L-Κιστίνη, L-Ισπίδίνη, L-Φανιλαλανίνη, διόξινο φωσφορικό κάλιο, L-Μεθειονίνη, L-Αργινίνη, γλυκωύχο νάτριο, δπρωγική γολίνη, L-Τρυπτοφάνη, κπρικό σάβστο, L-Ασκορβικό οξύ, γλυκωύχο σάβστο, αντιοξειδωτικά (Ασκήθηνη ηλέκαιο, παλμτικό ασκορβύλιο), τωυρίνη, M-ινωσπίλη, τεχνητή γλυκαντική ουσία (σουκραλόζη), θειικός σίδηρος, L-Κορμίνη, θειικός μεθοδρμωρος οξική DL-α-τοκοφερόλη, νικωτιναμίδιο, D-παντοθενικό σάβστο, θειικός γαλκός, ριβοφλοβίνη, θειικό μαγγάνιο, υδρωγλωρική θειωμίνη, υδρωγλωρική πυριδοξίνη, Βιταμίνη Α, ιωδούχο κάλιο, φυλικό οξύ, μολυβδωικό νάτριο, γλυκωύχο χρώμο, σεληνιώδες νάτριο, φωτωμεναδίνη, D-βίστινη, γαλκωκασφερόλη, κωανοκωβαλαμίνη,

Misurini/Μεζούρα/Οιμέρky/Οιμέρky	Acqua/Νερό/Voda/Voda (ml)			
1 (7,3 g)	30			
3 (21,9 g)	90			
10 (73 g)	300			

**CZ** **Doporučený příjem:** Množství a ředění výživy určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti od věku, tělesné hmotnosti a zdravotního stavu pacienta. **Doporučená koncentrace výživy:** doporučená koncentrace výživy je 21,1 % (1 kcal/ml) - k dosažení této koncentrace přidejte 1 zarovanou odměrku na každých 30 ml vody. 1 zarovaná odměrka obsahuje 7,3 g prášku.

**Příprava:** Umyjte si důkladně ruce a použijte čisté nádoby. Doporučené množství vody odměřte do nádoby. Do vody přidejte předepsané množství prášku. Použijte pouze přiloženou odměrku. Nádobu uzavřete a obsah důkladně protřepejte, dokud se prášek zcela nerozpustí. Připravenou výživu uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin od přípravy. Bezprostředně před použitím výživu protřepejte nebo zamíchejte. Pro perorální podání - výrobek nejlépe chutná vychlazený.

**Upozornění:** Připravenou výživu neprevázejte. K přípravě či ohřívání výživy nepoužívejte mikrovlnnou troubu.

**Skladování:** Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavírejte. Obsah plechovky spotřebujte do 1 měsíce po otevření. Baleno v ochranné atmosféře.

**Složení:** sušený glukózoový sirup, rafinované rostlinné oleje (triglyceridy se středním řetězcem (palmojádrový a/nebo kokosový olej), slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, řepkový, slunečnicový), L-serin, L-glutamin, maltodextrin, glycin, L-alanin, L-leucin, L-lysin acetát, L-threonin, citran tridaselný, L-tyrosin, aroma, emulgátor (E472c), L-valin, L-isoleucin, hydrogénfosforečan vápenatý, chlorid horečnatý, L-prolin, hydrogénfosforečan disodný, uhličitan vápenatý, L-cystin, L-histidin, L-fenylnalanin, hydrogénfosforečan didraselný, L-methionin, L-arginin, chlorid sodný, cholin bitartrát, L-tryptofan, citran trívápenatý, kyselina L-askorbová, chlorid vápenatý, antioxidanty (slunečnicový lecitin, askorbyl-palmitát), taurin, M-inozitol, sladidlo (sukralóza), siran železnatý, L-karnitin, siran zinočnatý, DL-α-tokoferylacétát, nikotinamid, D-pantothénát vápenatý, siran medňnatý, riboflavin, siran mangánatý, thiamin hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, retinyl-acetát, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, molybdénan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, fytomenadiol, D-biotin, cholekaliferol, kyanokobalamin.

**SK** **Odporovaný príjem:** Množstvo a koncentráciu výživy určí lekár alebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinickej výživy v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a zdravotného stavu pacienta.

**Odporovaná koncentrácia výživy:** Odporovaná koncentrácia výživy je 21,1 % (1 kcal/ml)- na dosiahnutie tejto koncentrácie pridajte 1 zarovanú odmerku na každých 30 ml vody. 1 zarovaná odmerka obsahuje 7,3 g prášku.

**Priprava:** Umyte si dôkladne ruky a použijte čistý riad. Odmerajte odporúčané množstvo vody do nádoby. Do vody pridajte predpísané množstvo prášku. Používajte iba priloženú odmerku. Nádobu uzavorte a obsah dôkladne premiešajte, kým sa prášok úplne nerozpustí. Pripravenú výživu uchovávejte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín od prípravy. Bezprostredne pred použitím výživu pretrepte alebo premiešajte. Pre perorálne podanie - výrobok najlepšie chutná vychladený.

**Upozomenie:** Pripravenú výživu neprevádzajte. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na prípravu ani na zohrievanie výživy.

**Skladovanie:** Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po každom použití plechovku dobre uzavorte. Obsah plechovky spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení. Balené v ochrannej atmosfére.

**Zloženie:** sušený glukózoový sirup, rafinované rastlinné oleje (triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (palmojadrový a/alebo kokosový olej), slnečnicový s vysokým obsahom kyseliny olejovej, repkový, slnečnicový), L-serin, L-glutamin, maltodextrin, glycin, L-alanin, L-leucin, L-lyzinoctan, L-treonin, citran tridaselný, L-tyrozin, L-alanin, L-leucin, L-lyzin octan, L-threonin, citran tridaselný, L-tyrosin, aroma, emulgátor (E472c), L-valin, L-isoleucin, hydrogénfosforečan vápenatý, chlorid horečnatý, L-prolin, hydrogénfosforečan disodný, uhličitan vápenatý, L-cystin, L-histidin, L-fenylnalanin, hydrogénfosforečan didraselný, L-methionin, L-arginin, chlorid sodný, cholin bitartrát, L-tryptofan, citran trívápenatý, kyselina L-askorbová, chlorid vápenatý, antioxidanty (slnečnicový lecitín, askorbyl-palmitát), taurín, M-inozitol, sladidlo (sukralóza), siran železnatý, L-karnitín, siran zinočnatý, DL-alfa-tokoferylacétát, nikotinamid, D-pantoténát vápenatý, siran medňnatý, riboflavin, siran mangánatý, thiamín hydrochlorid, pyridoxín hydrochlorid, retinylacétát, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, molybdénan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, fytomenadión, D-biotín, cholekaliferol, kyanokobalamin.

Informazioni nutrizionali per/Διατροφικές Πληροφορίες ανά/Nutriční informace na/Уživновне údaje na			
100 g di polvere:/100 gr σκόνης:/100 g prášku:	100 ml*	100 g di polvere:/100 gr σκόνης:/100 g prášku:	100 ml*
<b>Energia/Ενέργεια/Energetická hodnota</b>	1992 kJ 475 kcal	Vit. B6/Βιτ. Β6 Acido folico/Φυλικό οξύ/Kyselina listová Vit. B12/Βιτ. Β12 Biotina/Biotίνη/Biotin/Biotin Vit. C/Βιτ. C	0,48 mg 71,3 µg 1,2 µg 14,3 µg 47,5 mg
<b>Grassi/Λίπη/Tuky (42 Εν%)</b> di cui/εκ των οποίων/z toho - Acidi grassi saturi/Κορεσµένα/Nasyčené mastné kyseliny/ Nасытёné mastné kyseliny - Acidi grassi monoinsaturi/Μονοακόρεστα/ Μονοηηασυςενέ mastné kyseliny/Μονοηηασυςενέ mastné kyseliny - Acidi grassi polinsaturi/Πολυακόρεστα/ Polynenasycené mastné kyseliny/Polynenasy/тёné mastné kyseliny	22,0 g 9,4 g 7,6 g 4,0 g	<b>Minerali e Oligoelementi/Μέταλλα και Ιχθυοστογεία/Minerální látky a stopové prvky/Minerálne látky a stopové prvky</b> Na K Cl Ca P Mg Fe Zn Cu Mn Mo Se Cr I	60,1 mg 115 mg 92,2 mg 90,3 mg 66,2 mg 14,0 mg 1,2 mg 1,1 mg 0,10 mg 0,06 mg 4,5 µg 3,2 µg 1,6 µg 15,0 µg
<b>Carboidrati/Υδατάνθρακες/Sacharidy (47 Εν%)</b> di cui/εκ των οποίων/z toho - Zuccheri/Σάκχαρα/Cukry	56,0 g 5,0 g	<b>Altri/Άλλά/Λινé/Iné</b> Colina/Χολίνη/Cholin/Cholin Inositolo/Ινωσητόλη/Inositol/Inozitol L-Camitina/L-Κορμίνη/L-karnitín/L-karnitín Taurina/Ταυρίνη/Taurin/Taurin Osmolalita/Όσμωτικότητα/Osmolalita	95,0 mg 26,1 mg 15,80 mg 31,45 mg
<b>Proteine equivalenti/Ισοδύναμο πρωτεΐνης/Bilkoviny (ekvivalent)/ Bielkoviny (ekvivalent) (11 Εν%)</b>	13,3 g		600 mgOsmol/kg ΗεΟ
<b>Sale/Άλας/Sól/Sof</b>	0,71 g		
<b>Vitamine/Βιταμίνες/Vitamins/Vitamins</b> Vit. A/Βιτ. Α Vit. D/Βιτ. D Vit. E/Βιτ. Ε Vit. K/Βιτ. Κ Tiamina/Θειαμίνη/Thiamin/Tamin Riboflavina/Ριβοφλοβίνη/Riboflavin/Riboflavin Niacina/Νιοοίνη/Niacin/Niacin Acido pantotenico/Παντοθενικό Οξύ/Kyselina pantotenová/ Kyselina pantotenová	214 µg 6,2 µg 6,7 mg (α-TE/ET) 19,0 µg 0,48 mg 0,95 mg 5,3 mg 1,9 mg		45,2 µg 1,3 µg 1,4 mg (α-TE/ET) 4,0 µg 0,10 mg 0,20 mg 5,3 mg 0,40 mg
<b>Fibre/Εδώδιμες ίνες/Vláknina (0 Εν%)</b>	0 g		
<b>Acido pantotenico/Παντοθενικό Οξύ/Kyselina pantotenová/ Kyselina pantotenová</b>	1,9 mg		

\*Alla concentrazione raccomandata del 21,1%\*/Στην προτεινόμενη αραίωση 21,1%\*/Při doporučené koncentraci 21,1 %\*/Při odporúçanej koncentracii 21,1%

**NUTRICIA**  
**neocate**<sup>®</sup>  
**Junior**

10327163