

Σημαντική σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χρησιμοποιείται υπό ιατρική επίβλεψη και μετά την πλήρη εξέταση όλων των επιλογών διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του θηλασμού. Κατάλληλο ως αποκλειστική διατροφή για βρέφη κάτω του 1 έτους.

Προτεινόμενη Δοσολογία: Η ποσότητα της τροφής και της αραίωσης θα πρέπει να καθορίζεται από ιατρό ή διατολόγο μόνο, και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς.

Συνιστώμενη συγκέντρωση: Μια κοφή μεζούρα παρέχει περίπου 4,5g. Προσθέστε 1 μεζούρα σκόνης σε κάθε 30ml νερού για να δημιουργήσετε την συνιστώμενη συγκέντρωση τροφής (13,5% w/v). Η ασπιλικότητα στην προτεινόμενη διάλυση (π.χ. 13,5 g σκόνης συμπληρωμένα με νερό έως τα 100ml) είναι 340 mOsmol/kg H₂O.

Προετοιμασία:
Οδηγίες αραίωσης με μπιπερά: Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Η ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΣΑΣ.



1. Πλύντε τα χέρια σας και καθαρίστε το χώρο παρασκευής. Αποστειρώστε τα μπιπερά και τις θηλές.
2. Βράστε νερό για 5 λεπτά ή σε βραστήρα μέχρι να σβήσει η κόκκινη λυχνία. Αφήστε το διάλυμα να κρυώσει τουλάχιστον για μισή ώρα μέχρι να είναι ανεκτό στον καρπό σας. Προσθέστε το νερό σε αποστειρωμένο μπιπερά.
3. Γεμίστε κοφτά με σκόνη τη μεζούρα που παρέχεται με τη βοήθεια ενός καθαρού μαγακιριού. Μην πιέσετε τη σκόνη μέσα στη μεζούρα. Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη μεζούρα.
4. Προσθέστε τις ενδεικνυόμενες μεζούρες προϊόντος στο νερό. Τοποθετήστε το καπάκι στη φιάλη και ανακινήστε μέχρι η σκόνη να διαλυθεί. Πριν το τσίγμα βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα είναι σε κατάλληλη θερμοκρασία τοποθετώντας λίγες σταγόνες στον καρπό σας.
5. Τυχόν υπόλοιπο που μένει στο μπουκάλι μετά από μία ώρα τσίγματος πρέπει να πετάγεται. Το διάλυμα δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιείται κατά το τσίγμα.

Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Πάντα να επανοποθετείτε το καπάκι στο κουτί μετά τη χρήση. Μετά το άνοιγμα, καταναλώστε εντός 1 μήνα. Συσκευάζεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα.

Συστατικά: αποξηραμένο σκόνη γλυκόζης, εξυδατωμένα φυτικά έλαια (ηλιέλαιο υψηλό ελαϊκό, έλαιο κορύδας, κραιβέλιο, ηλιέλαιο), L-αργινίνη L-ασπαρτικό, L-λευκίνη, οξική L-λυσίνη, L-γλουταμίνη, L-προλίνη, γαλακτιματοποιητής (E472c), L-βαλίνη, γλυκίνη, L-ισολευκίνη, διοξείδιο φωσφορικού κάλιο, L-θρεονίνη, L-φαινυλαλανίνη, L-τυροσίνη, L-σερίνη, L-ιστιδίνη, L-αλανίνη, διβασικό φωσφορικό ασβέστο, τριπτικό κάλιο, χλωριούχο νάτριο, ανθρακικό ασβέστο, διπρωτικό γαλνίνη, L-κυστίνη, γλυκεροφωφορικό ασβέστο, L-τριμυτοφάνη, κτρικό ασβέστο, χλωριούχο μαγνήσιο, L-μεθειονίνη, τριβασικό φωσφορικό ασβέστο, έλαιο από *Morbella alba*, L-ασπαρτικό μαγνήσιο, νοσπίνη, L-ασκορβικό οξύ, αντιοξειδωτικά (λεβένθη ηλιέλαιο, πολυμικό ασκορβόλιο), ταυρίνη, θειακός σίδηρος, θειακός ψευδάργυρος, L-καρνιτίνη, οξική DL-α-τοκοφερόλη, άλας νατρίου 5' μονοφωσφορικής ουρίνης, 5-μονοφωσφορική κυτθίνη, νικωτιναμίδιο, D-παντοθενικό ασβέστο, άλας νατρίου 5' μονοφωσφορικής νοσίνης, 5-μονοφωσφορική αδενοσίνη, θειακός χαλκός, νητρική θειαμίνη, βιθοβλαβίνη, υδροχλωρική πυριδόνη, οξική ρετινόλη, ιαδούχο κάλιο, θειακό μαγνήσιο, περρύλιομονογλυτωμικό, φυτομειοσίνη, σεληνίδες νάτριο, χλωριούχο χρώμιο, μολυβδανικό νάτριο, D-βιοτίνη, χοληχολαφερόλη, κυανοκαβαλαμίνη.

Σημείωση: Η βρεφική φόρμουλα σε σκόνη δεν είναι αποστειρωμένη. Η βρεφική φόρμουλα πρέπει να παρασκευάζεται άμεσα πριν την κατανάλωση. Μη βράζετε το διάλυμα και Μη χρησιμοποιείτε φούνο μικροκυμάτων για να ετοιμάσετε ή να ζετανέτε το διάλυμα.

Επισήμανση οδοντικής φροντίδας: Η καλή υγιεινή των δοντιών είναι σημαντική για βρέφη και παιδιά, καθώς η παρατεταμένη ή συχνή επαφή ροφημάτων και τροφίμων με τα δόντια αυξάνει τον κίνδυνο της φθοράς των δοντιών. Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια των παιδιών καθαρίζονται μετά το τελευταίο γεύμα.

Συμβουλευτικές οδηγίες:

Ηλικία βρέφους	Βάρος βρέφους	Κοφές κουταλιές Neocate LCP	Βρασιμένο χλιαρό νερό	Αριθμός γευμάτων σε 24 ώρες
	kg		ml	
Γέννηση	3,5	3	90	6-7
2 εβδομάδιων	4	4	120	6
2 μηνών	5,5	5	150	5-6
3 μηνών	6	6	180	5
5 μηνών	7,5	7	210	4-5
7 μηνών	8,5	7	210	4
10 μηνών	9	8	240	4

Το βρέφος μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στο παράδειγμα. Η εισαγωγή νέων τροφών πρέπει να γίνεται υπό ιατρική ή διατολογική παρακολούθηση και η ποσότητα του προϊόντος που καταναλώνεται πιθανά να χρειαστεί ανάλογη μείωση.

NUTRICIA Neocate[®] LCP

Θρεπτικά πλήρης βρεφική φόρμουλα σε μορφή σκόνης με βάση τα ελεύθερα αμινοξέα Υποαλλεργικό

Για τη διατροφική διαχείριση

- Αλλεργίας στο Γάλα Αγελάδος • Πολλαπλών τροφικών αλλεργιών
- Άλλων παθήσεων όπου ενδείκνυται η στοιχειακή διατροφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

0-12
μήνων

400 g e

Διατροφικές Πληροφορίες	Per 100 g	Per 100 ml (13,5% reconstituted)	Διατροφικές Πληροφορίες	Per 100 g	Per 100 ml (13,5% reconstituted)
Ενέργεια	2062 kJ 493 kcal	278 kJ 67 kcal	Φυλλικό Οξύ	68,5 μg	9,24 μg
Λίπη (47%)	25,6 g	3,5 g	Φολικό Οξύ	114 μg	15,4 μg
- Κορεσμένα	10,0 g	1,3 g	Bt. B12	1,38 μg	0,19 μg
- Μονοακόρεστα	11,5 g	1,5 g	Βιοτίνη	19,2 μg	2,59 μg
- Πολυακόρεστα	4,2 g	0,56 g	Γιαντοθενικό Οξύ	3,05 mg	0,41 mg
- Λινολεϊκό οξύ	3,36 g	453 mg	Μέταλλα και χηστοστοχεία		
- α-Λινολεϊκό οξύ	0,34 g	45,6 mg	Na	217 mg	29,3 mg
- Αραχιδονικό οξύ	0,12 g	16,6 mg	K	540 mg	72,9 mg
- Δωκοσαεξανόϊκό (DHA)	0,12 g	16,6 mg	Cl	392 mg	53,0 mg
Υδατάνθρακες (42%)	52,5 g	7,1 g	Ca	571 mg	77,1 mg
- Σάκχαρα	4,6 g	0,62 g	P	372 mg	50,2 mg
Εδώδιμες Ίνες	0 g	0 g	Mg	51,9 mg	7,01 mg
Ισοδύναμο πρωτεΐνης (11%)	13,3 g	1,8 g	Fe	7,39 mg	1,00 mg
Άλας	0,54 g	0,07 g	Cu	0,42 mg	0,057 mg
Βιταμίνες			Zn	5,42 mg	0,73 mg
Bt. A	431 μg	58,2 μg	Mn	0,049 mg	0,007 mg
Bt. D	11,8 μg	1,60 μg	I	103 μg	14,0 μg
Bt. E	(9,85 mg TE/ET)	11,0 mg	Mo	11,3 μg	1,53 μg
Bt. C	52,7 mg	7,11 mg	Se	18,7 μg	2,53 μg
Bt. K	44,5 μg	6,00 μg	Cr	10,8 μg	1,46 μg
Θειαμίνη	0,59 mg	0,08 mg	Λοσιπά		
Ριβοφλαβίνη	0,59 mg	0,08 mg	L-Καρνιτίνη	9,85 mg	1,33 mg
Νιασίνη	(9,41 mg NE/EN)	4,09 mg	Χολίνη	137 mg	18,5 mg
Bt. B6	0,48 mg	0,06 mg	Ινσοτόλη	110 mg	14,9 mg
			Ταυρίνη	32,0 mg	4,32 mg
			Νουκλεοσιδια	17,2 mg	2,33 mg
			Οσμωτικότητα/ kg		310 mOsmol/l
					340 mOsmol/kg H ₂ O

Ανάλογη έως: Βλέπετε το κάτω μέρος της συσκευασίας.

Παράγεται από την SHS International Ltd.
Numil Hellas A.E. - Παράδρομος 17 χλμ Εθνικής Οδού
Αθηνών Λαμίας & Καλαμάτας 2 - 14564 N.
Κηφισιά - Τηλ 210 6248547 -
Γραμμή φροντίδας 8001168600
χωρίς χρέωση
www.nutricia-medical.gr
Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ:8665207-12-2012



10891057
14457



5 016533 651720