

NUTRICIA
Neocate[®]
 SYNEO

0-12
 μήνες/
 mesíců

Υποαλλεργική βρεφική φόρμουλα σε μορφή σκόνης με βάση τα ελεύθερα αμινοξέα
 Hypoallergenní kojenecká výživa na bázi aminokyselin, v prášku

- Πατενταρισμένη σύνθεση με *Bifidobacterium breve* M-16V, scFOS και lcFOS inesc
- *S Bifidobacterium breve* M-16V a s vlákninami scFOS a lcFOS



- Οι οδηγίες παρασκευής διαφέρουν από άλλες φόρμουλες: ελέγξτε και ακολουθήστε προσεκτικά
- Νόvod na přípravu je odlišný od jiných přípravků. Pečlivě si jej pročtěte a dodržujte.

400 g e

GR Προτεινόμενη Δοσολογία: Η ποσότητα της τροφής και της αραίωσης θα πρέπει να καθορίζεται από ιατρό ή διατολόγο μόνο, και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς.

Συνιστώμενη συγκέντρωση: Κάθε μεζούρα παρέχει 4,8g σκόνης. Για να επιτευχθεί η προτεινόμενη διάλυση (14,4% w/v) προσθέστε μία κοφτή μεζούρα σκόνης για κάθε 30ml νερό. Η ωσμωτικότητα στην προτεινόμενη διάλυση (π.χ. 14,4 g σκόνης συμπληρωμένα με νερό έως τα 100ml) είναι 360 mOsmol/kg H₂O.

Προετοιμασία: Οδηγίες αραίωσης με μπιμπερό: Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Η ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΣΑΣ.

1. Πλύνετε τα χέρια σας και καθαρίστε το χώρο παρασκευής. Αποστειρώστε τα μπιμπερό και τις θηλές.
2. Βράστε φρέσκο νερό για 5 λεπτά, ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα νερού στο αποστειρωμένο μπιμπερό, τοποθετήστε το πιάμα στο μπιμπερό και αφήστε να κρυσταί τουλάχιστον για 30 λεπτά, μέχρι να το σώστε χλιαρό στον καρπό.
3. Γεμίστε κοφτά την μεζούρα που παρέχεται με σκόνη με τη βοήθεια ενός καθαρού μαχαίριου. Μην πιέζετε τη σκόνη μέσα στη μεζούρα. Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μεζούρα.
4. Προσθέστε τις ενδεικνυόμενες μεζούρες προϊόντος στο νερό. Τοποθετήστε το καπάκι στη θηλή και ανακινήστε μέχρι η σκόνη να διαλυθεί. Πριν το τσίμα βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα είναι σε κατάλληλη θερμοκρασία τοποθετώντας λίγες σταγόνες στον καρπό σας. Να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή.
5. Τυχόν υπόλοιπο που μένει στο μπουκάλι μετά από μία ώρα τσίματος πρέπει να πετάεται. Το διάλυμα δεν πρέπει να ξαναζεσταίνεται κατά το τσίμα.

Σημείωση: Η βρεφική φόρμουλα σε σκόνη δεν είναι αποστειρωμένη. Η βρεφική φόρμουλα πρέπει να παρασκευάζεται άμεσα πριν την κατανάλωση. Μην βράζετε το διάλυμα και μην χρησιμοποιείτε φούνο μικροκυμάτων για να ετοιμάσετε ή να ζεσταίνετε το διάλυμα. Η θέρμανση και η ακατάλληλη προετοιμασία μπορεί να περιορίσουν τα οφέλη του *Bifidobacterium breve* M-16V.

Επισήμανση οδοντικής φροντίδας: Η καλή υγιεινή των δοντιών είναι σημαντική για βρέφη και παιδιά, καθώς η παρατεταμένη ή συχνή επαφή ροφημάτων και τροφίμων με τα δόντια αυξάνει τον κίνδυνο της φθοράς των δοντιών. Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια των παιδιών καθαρίζονται μετά το τελευταίο γεύμα.

Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Πάντα να επανατοποθετείτε το καπάκι στο κουτί μετά τη χρήση. Μετά το άνοιγμα, καταναλώνεται εντός 2 εβδομάδων. Συσκευάζεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα.

Συστατικά: αποξηραμένο σιρόπι γλυκόζης, εξευγενισμένα φυτικά έλαια (ηλιέλαιο υψηλού ελαϊκού, τριγλυκερίδια μέσης αλυσού (καρύδα ή/και φουνιέλαιο), κρομυβέλαιο, ηλιέλαιο, εδάδιμες ίνες (ολιγοφρουκτόζη (sc-FOS), ινουλίνη (lc-FOS)), L-αργινίνη, L-ασπαρτικό, L-λευκίνη, οξική L-λουλίνη, L-γλουταμίνη, L-προλίνη, L-βαλίνη, γαλακτομασποποιητής (E472c), L-ισολεκθίνη, γλυκίνη, L-θρεονίνη, διοξείδιο φωσφορικού κάλιο, L-Οσπινολικονίνη, L-τυροσίνη, L-Σερίνη, L-Ισπιδίνη, L-Αλανίνη, δισοακό φωσφορικό ασβέστο, τριπρωτικό κάλιο, γλυκισμένο νάτριο, ανθρακικό ασβέστο, διπρωτική χολίνη, L-Κυστίνη, γλυκεροφωσφορικό ασβέστο, L-τριπρωτίνη, κτηρικό ασβέστο, γλυκόζη μαγνήσιο, L-Μεθειονίνη, έλαιο από *Cryptocodinium cohnii*, τριβασικό φωσφορικό ασβέστο, έλαιο από *Mortierella alpina*, L-ασπαρτικό μαγνήσιο, ισοπυρρολίνη, L-Ασκορβικό οξύ, αντιοξειδωτικά (λεκιθίνη ηλιελαίου, παυλικό ασκορβύλιο), ταυρίνη, *Bifidobacterium breve* M-16V, θειικός σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, L-Καρνίνη, οξική DL-α-τοκοφερόλη, άλας νατρίου 5' μονοφωσφορικής ουρίνης, 5-μονοφωσφορική κυτιδίνη, νικοτινικό, D-πανθενικό ασβέστο, άλας νατρίου 5-μονοφωσφορικής ισολίνης, 5-μονοφωσφορική αδενοσίνη, άλας νατρίου 5-μονοφωσφορικής γουανοσίνης, θειικός χαλκός, νιτρική θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, οξική ρετινόλη, ιωδιούχο κάλιο, θειικό μαγνήσιο, πτεροϊλομονογλουταμικό οξύ, φυτομενάδιον, σεληνιώδες νάτριο, γλυκισμένο χρώμα, ιωδιούχο νάτριο, D-βιοτίνη, χοληχολοφερόλη, κυανοκοβαλαμίνη, *Bifidobacterium breve* M-16V 10¹⁰ CFU/100g.

Συνιστώμενη συγκέντρωση/Δοσολογία/Δοσολογία:

Ηλικία βρέφους κατά προσέγγιση/ Προβλεπόμενος ηλικία	Βάρος βρέφους κατά προσέγγιση/ Προβλεπόμενη μάζα	Μεζούρες/ Ποσότητα	Χλιαρό βρασμένο νερό / Ζηλωμένη προετοιμασμένη	Καταναλώστε εντός 24 ωρών / Ποσότητα
5 μήνες/μήσιν	7,5 kg	7	210 ml	4-5

CZ Doporučený příjem: Množství a ředění výživy určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta.

Doporučená koncentrace výživy: 1 zarovnaná odměrka obsahuje přibližně 4,8 g prášku. Pro dosažení doporučené koncentrace (14,4 % obj.) přidejte na každých 30 ml vody jednu zarovnanou odměrku prášku. Osmolalita výživy při doporučené koncentraci (např. 14,4 g prášku rozředěných vodou na 100 ml výživy) je 360 mOsmol/kg H₂O.

Příprava: Návod pro podávání z kojenecké lahve: ZDRAVÍ VAŠEHO DÍTĚTE ZÁVISÍ NA PŘESNÉM DODRŽOVÁNÍ NÁVODU NA PŘÍPRAVU A POUŽITÍ. NESPRÁVNÁ PŘÍPRAVA MŮŽE VAŠE DÍTĚ OHROŽIT.

1. Umyjte si důkladně ruce a místo, kde budete výživu připravovat. Vystérizujte láhev a savičku.
 2. Čerstvou vodu určenou pro kojence převařte po dobu 5 minut nebo dokud se nevyprve rychlovárná konvice, nalijte požadované množství vody do vystérizované láhve, uzavřete ji víčkem a nechte vodu vychladnout alespoň po dobu 30 minut tak, aby při kápnutí na vnitřní stranu zápěstí byla teplá.
 3. Přiloženou odměrku naplňte práškem, zarovnejte čistým a suchým nožem. Prášek do odměrky nevtačujte. Používejte pouze přiloženou odměrku.
 4. Předepsaný počet odměrek prášku přidejte do vody. Láhev uzavřete a protřepávejte, dokud se prášek nerozpustí. Před kmením ještě vyzkoušejte správnou teplotu výživy kápnutím několika kapek na zápěstí. Podávejte ihned po přípravě.
 5. Pokud směs nespotebujete do jedné hodiny od přípravy, obsah láhve zlikvidujte. Výživa se nesmí během podávání přehřát.
- Upozornění:** Prášková kojenecká výživa není sterilní. Výživu připravujte vždy těsně před podáváním. Výživu nepřevařujte. K ohřívání či přípravě výživy nepoužívejte mikrovlnnou troubu. Ohřívání a nesprávná příprava mohou limitovat přínosy *Bifidobacterium breve* M-16V.

Ochrana zdraví zoubků: Správná dentální hygiena je u kojenců a dětí důležitá, neboť dlouhodobá nebo pravidelná konzumace nápojů a výživy za použití savičky zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Ujistěte se, že po posledním denním kmení jsou zuby vyčištěny.

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Po otevření spotřebujte do 2 týdnů. Baleno v ochranné atmosféře.

Složení: sušený glukózový sirup, rafinované rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, triglyceridy se středním řetězcem (kokosový a/nebo palmový olej), řepkový, slunečnicový), vláknina (oligofruktóza (sc-FOS), inulin (lc-FOS)), L-arginin-L-aspartát, L-leucin, L-lysin-acetát, L-glutamin, L-prolin, L-valin, emulgátor (E472c), L-isoleucin, glycin, L-threonin, hydrogenoforečnan dibraselný, L-fenylalanin, L-tyrosin, L-serin, L-histidin, L-alanin, cytronoforečnan vápenatý, cytronoforečnan vápenatý, chlorid sodný, uhličitán vápenatý, cholin bitartrát, L-cystin, glyceroforečnan vápenatý, L-tryptofan, citronan vápenatý, chlorid hořečnatý, L-methionin, olej z *Cryptocodinium cohnii*, toforečnan vápenatý, olej z plisně *Mortierella alpina*, L-aspartát hořečnatý, inositol, kyselina L-askorbová, antioxidanty (slunečnicový lecitin, askorbyl-palmitát), taurin, *Bifidobacterium breve* M-16V, siran železnatý, siran zinečnatý, L-karnitin, DL-α-tokoferyl-acetát, sodná sůl uridin 5'-monofostát, cytidin 5'-monofostát, nikotinamid, D-pantothénat vápenatý, sodná sůl inosin 5'-monofostátu, adenosin 5'-monofostát, sodná sůl guanosin 5'-monofostátu, siran mědnatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, retinyl-acetát, jodid draselný, siran manganatý, kyselina pteroylmonoglutamová, fytomenacion, seleničtan sodný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, D-biotin, cholecalciferol, kyanokobalamin.

Bifidobacterium breve M-16V 1 x 10¹⁰ KTJ/100 g.

Το βρέφος μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στο παράδειγμα. Η εισαγωγή νέων τροφών πρέπει να γίνεται υπό ιατρική ή διατολογική παρακολούθηση και η ποσότητα του προϊόντος που καταναλώνεται πιθανό να χρειαστεί ανάλογη μείωση. Κojenec může vyžadovat menší či větší množství výživy, než jak je zde uvedeno. Zavádění jiných potravin vždy konzultujte s lékařem nebo dietologem. Je možné, že podávané množství Neocate Syneo bude třeba odvíjejícím způsobem snížit.