

Εξειδικευμένα θρεπτικά σκευάσματα



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η Nutricia είναι πρωτοπόρος εταιρία με εμπειρία άνω των 100 ετών στην Ιατρική Διατροφή. Σε συνεργασία με επιστήμονες απ' όλο τον κόσμο, βελτιώνει συνεχώς την εξειδικευμένη της γνώση στα θρεπτικά συστατικά και τον ρόλο που παίζουν στον ανθρώπινο οργανισμό για να αναπτύσσει καινοτόμες διατροφικές λύσεις που βοηθούν τους ανθρώπους να ζήσουν περισσότερο, πιο ευτυχισμένοι και υγιείς.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ NUTRICIA

Η Nutricia διαθέτει μια **μεγάλη και ολοκληρωμένη σειρά τροφίμων** για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που είναι σχεδιασμένα να καλύψουν τις εξειδικευμένες διατροφικές ανάγκες των ασθενών στο νοσοκομείο, στα κέντρα φροντίδας/αποκατάστασης και στην κοινότητα.

Τα θρεπτικά σκευάσματα της Nutricia έχουν εξειδικευμένες **συνθέσεις πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά**, των οποίων η πρόσληψη δεν θα ήταν εφικτό να επιτευχθεί αποκλειστικά από τη διατροφή.

Προορίζονται για ασθενείς με λειτουργικό ή μερικώς λειτουργικό γαστρεντερικό σύστημα που δεν μπορούν ή δεν είναι πρόθυμοι να καταναλώσουν επαρκείς ποσότητες φαγητού για να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες.

Ορισμένα σκευάσματα είναι **κατάλληλα ως αποκλειστική πηγή διατροφής**, ενώ άλλα προορίζονται για **χρήση μόνο συμπληρωματικά** στα πλαίσια μιας κανονικής διατροφής.

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε **διαφορετικές μορφές, συνθέσεις και γεύσεις** για καλύτερη συμμόρφωση και κάλυψη των αναγκών.


Τα πόσιμα σκευάσματα διατροφικής υποστήριξης της Nutricia προορίζονται για εντερική χρήση μόνο και πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό ιατρική επίβλεψη.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **www.nutriciaprofessionals.gr** αποκλειστικά για Επαγγελματίες Υγείας και γνωρίστε τις διατροφικές μας λύσεις ανά κατηγορία εξειδίκευσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

- Τα σκευάσματα διατροφικής υποστήριξης συνιστάται να σερβίρονται δροσερά
- Συνιστάται να λαμβάνονται μεταξύ των γευμάτων
- Για ασθενείς που λαμβάνουν διατροφική υποστήριξη σε μακροχρόνια βάση ή πολλά διατροφικά σκευάσματα, η χρήση μιας ποικιλίας σκευασμάτων συμβάλλει θετικά στη συμμόρφωση του ασθενή με τη διατροφή. Ρωτήστε τακτικά τους ασθενείς σας για τις προτιμήσεις τους στις γεύσεις. Στα περισσότερα από τα θρεπτικά μας σκευάσματα παρέχεται ποικιλία γεύσεων.

Συστήστε στους ασθενείς σας να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα Fortimel για την παρασκευή νόστιμων επιδορπίων ή γευμάτων. Μοιραστείτε μαζί τους τις συνταγές Fortimel που θα βρείτε στην ιστοσελίδα **www.nutriciaprofessionals.gr** αποκλειστικά για Επαγγελματίες Υγείας.



Fortimel Protein 1,5 kcal

(Παλιά ονομασία Fortimel Extra)

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, υπερθερμιδικό πόσιμο θρεπτικό σκεύασμα. Εμπλουτισμένο με τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (24% της ενέργειας)
- Υπερθερμιδικό (1,5 kcal/ml)
- Ελεύθερο γλουτένης

Ενδείξεις

- Για τη διαιτητική διαχείριση της υποθρεψίας σχετιζόμενης με ασθένεια
- Κατάλληλο για ασθενείς με αυξημένες ενεργειακές και πρωτεϊνικές απαιτήσεις

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών
- Για εντερική χρήση μόνο, δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση

Σημαντική Σημείωση

- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά άνω των 3 ετών

Προτεινόμενη Δοσολογία

- 1-3 μπουκάλια την ημέρα ή ακολούθως σύστασης Ιατρού ή Διαιτολόγου

Γεύσεις

- Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα, Καφέ

Συσκευασία

- Μπουκάλι 200ml



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: FORTIMEL PROTEIN 15KCAL
(ΒΑΝΙΛΙΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΚΑΦΕΣ): 82379/27-07-2023
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100ml	ανά μερίδα (200 ml)
Ενέργεια	kJ	630	1260
	Kcal	150	300
Λιπαρά (31 Εν%)	g	5,2	10,4
εκ των οποίων:			
Κορεσμένα	g	0,6	1,2
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	3,1	6,2
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	1,5	3
Υδατάνθρακες (45 Εν%)	g	16,7	33,4
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	7,1/6,9	14,2/13,8
Εκ των οποίων Λακτόζη	g	2,1/2,0	4,2/4,0
Εδώδιμες ίνες (0 Εν%)	g	<0,5	1
Πρωτεΐνη (24 Εν%)	g	9	18
Αλάτι	g	0,15	0,3
Βιταμίνες			
A	µg-Re	116	232
D	µg	2,6	5,2
E	mg-a-TE	2,5	5
K	µg	11	22
B1	mg	0,19	0,4
B2	mg	0,2	0,4
B3 (Νιασίνη)	mg-NE	2,5	5
B5 (Πανθοθενικό Οξύ)	mg	0,83	1,7
B6	mg	0,27	0,5
Φυλλικό Οξύ	µg	41	82
B12	µg	0,5	1
Βιοτίνη	µg	5	10
C	mg	17	34
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	60	120
K	mg	208/218	416/436
Cl	mg	83	166
Ca	mg	216	432
P	mg	165/168	330/336
Mg	mg	31	62
Fe	mg	1,6	3,2
Zn	mg	1,8	3,6
Cu	mg	0,15	0,3
Mn	mg	0,34	0,7
F	mg	0,18	0,4
Mo	µg	7	14
Se	µg	9	18
Cr	µg	4,2	8,4
I	µg	25	50
Λοιπά			
Χολίνη	mg	11/10	22/20
Οσμωτικότητα	mOsmol/l		440/410

Στην γεύση σοκολάτα όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αυτές εισηγούνται με πορτοκαλί γραμματοσειρά

Fortimel Protein 2Kcal

(Παλιά ονομασία Fortimel Extra 2 kcal)

Υψηλότερη Ενέργεια, Υψηλότερη Πρωτεΐνη

Περιγραφή

Τρόφιμο για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς.

Ανά μπουκάλι (200mL):

• 400kcal • 20g πρωτεΐνης

Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Λοιπά Χαρακτηριστικά

- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (20% της ενέργειας)
- Υπερθερμιδικό (2kcal/ml)
- Ελεύθερο: γλουτένης, εδώδιμων ινών
- Αναλογία λινολεϊκού: άλφα λινολενικού, 5:1 (9.3%: 1.8%), βάσει συστάσεων¹
- Βιταμίνη D: 10μg/ μπουκάλι (200mL)
- Διατροφικά πλήρες: Κατάλληλο για αποκλειστική σίτιση

Ενδείξεις

- Για τη διατροφική διαχείριση της υποθρεψιάς που σχετίζεται με ασθένεια (π.χ ογκολογικοί ή χειρουργημένοι ασθενείς)
- Κατάλληλο για ηλικιωμένους ασθενείς, που δεν καταφέρνουν να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες μέσω της διατροφής
- Ανορεξία λόγω ασθένειας ή θεραπείας, δυσκαταποσία, αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, δυσαπορρόφηση λόγω ασθένειας ή φαρμακευτικής αγωγής

Αντενδείξεις

Ακατάλληλο για:

- Ασθενείς με αλλεργία στο γάλα αγελάδος
- Ασθενείς με γαλακτοζαμία
- Χρήση μέσω καθετήρα
- Παρεντερική σίτιση
- Γαστρεντερική ανεπάρκεια
- Εντερικά συρίγγια με έντονες απώλειες
- Εντερική απόφραξη
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών (χορηγείται με προσοχή σε παιδιά άνω των 3 ετών)

Προτεινόμενη Δοσολογία

- Συμπληρωματική σίτιση: 1-2 μπουκάλια/ ημέρα
 - Αποκλειστική σίτιση: 4-5 μπουκάλια/ ημέρα
- Ή ανάλογα με τις συστάσεις του Ιατρού ή του Διαιτολόγου

Γεύσεις

- Βανίλια, Φράουλα, Μόκα

Συσκευασία

- Μπουκάλι 200mL



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: FORTIMEL PROTEIN 2KCAL (ΒΑΝΙΛΙΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΜΟΚΑ): 82851/28-07-2023
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

1.BNF. Unsaturated fatty acids: nutritional and physiological significance: the report of the British Nutrition Foundation's Task Force. London; 1992. Report No.: Contract No.

		ανά 100ml	ανά μερίδα (200mL)
Ενέργεια	kJ	839	1678
	Kcal	200	400
Λιπαρά (38,8% Ενέργειας)	g	8,6	17,2
Εκ των οποίων Κορεσμένα	g	0,88	1,76
Υδατάνθρακες (40,9% Ενέργειας)	g	20,6	41,2
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	15,4	30,8
Λακτόζη	g	0,2	0,4
Εδώδιμες Ίνες (0% Ενέργειας)	g	0	0
Πρωτεΐνη (20,3% Ενέργειας)	g	10,1	20,2
Αλάτι	g	0,2	0,4
Βιταμίνες			
A	μg	174	348
D3	μg	5	10
E	mg(a-TE)	4.01 (3.74)	8,02 (7,48)
K	μg	11	22
Θειαμίνη	mg	0,33	0,66
Ριβοφλαβίνη	mg	0,37	0,74
Νιασίνη	mg	2,33	4,66
Παντοθενικό οξύ	mg	1,1	2,2
B6	mg	0,5	1
Φυλλικό οξύ	μg	52,7	105,4
B12	μg	0,8	1,6
Βιοτίνη	μg	6,9	13,8
C	mg	21	42
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	85,1	170,2
K	mg	172	344
Cl	mg	83	166
Ca	mg	167	334
P	mg	156	312
Mg	mg	17	34
Fe	mg	3,3	6,6
Zn	mg	2,1	4,2
Cu	mg	0,4	0,8
Mn	mg	0,2	0,4
F	mg	0,2	0,4
Mo	μg	13	26
Se	μg	11,7	23,4
Cr	μg	7	14
I	μg	38,3	76,6
Λοιπά			
Χολίνη	mg	64,7	129,4
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l	730	

Fortimel 1,5 kcal

(Παλιά ονομασία Fortimel Energy)

Χωρίς Λακτόζη

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Υπερθερμιδικό πόσιμο θρεπτικό σκεύασμα. Εμπλουτισμένο με όλες τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Διατροφικά πλήρες
- Υπερθερμιδικό (1,5 kcal/ml)
- Ελεύθερο γλουτένης
- Ελεύθερο λακτόζης

Ενδείξεις

- Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Για τη διατροφική διαχείριση της υποθρεψίας σχετιζόμενης με ασθένεια
- Κατάλληλο για ασθενείς με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών
- Για εντερική χρήση μόνο, δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση
- Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαιμία

Σημαντική Σημείωση

- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά άνω των 3 ετών

Προτεινόμενη Δοσολογία

- Ως αποκλειστική πηγή διατροφής 5-7 μπουκάλια την ημέρα, ως συμπληρωματική διατροφή 1-3 μπουκάλια την ημέρα ή ακολουθώντας σύσταση Ιατρού ή Διαιτολόγου

Γεύσεις

- Βανίλια, Σοκολάτα

Συσκευασία

- Μπουκάλι 200ml



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: FORTIMEL 1.5KCAL (BANI/IA): 83217/28-07-2023,
FORTIMEL 1.5KCAL (ΣΟΚΟΛΑΤΑ): 119491/8-11-2023
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100ml	ανά μερίδα (200 ml)
Ενέργεια	kJ	625/630	1250/1260
	Kcal	150	300
Λιπαρά (35 Εν%)	g	5,8	11,6
εκ των οποίων:			
Κορεσμένα	g	0,6 / 0,7	1,2 / 1,4
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	3,5 / 3,4	7
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	1,7	3,4
Υδατάνθρακες (49 Εν%)	g	18,4 / 18,5	36,8 / 37
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	6,7 / 6,8	13,4 / 13,6
Εκ των οποίων Λακτόζη	g	<0,025	<0,05
Εδώδιμες ίνες (0 Εν%)	g	- / 0,3	0,6
Πρωτεΐνη (16 Εν%)	g	5,9 / 5,8	11,8 / 11,6
Αλάτι	g	0,23	0,46
Βιταμίνες			
A	µg-Re	123	246
D	µg	1,1	2,2
E	mg-a-TE	1,9	3,8
K	µg	8	16
B1	mg	0,23	0,5
B2	mg	0,24	0,5
B3	mg-NE	2,7	5,4
B5	mg	0,8	1,6
B6	mg	0,26	0,5
Φυλλικό Οξύ	µg	40	80
B12	µg	0,32	0,6
Βιοτίνη	µg	6	12
C	mg	15	30
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	90	180
K	mg	159	318
Cl	mg	87	174
Ca	mg	91	182
P	mg	78	156
Mg	mg	23	46
Fe	mg	2,4	4,8
Zn	mg	1,8	3,6
Cu	mg	0,27	0,54
Mn	mg	0,5	1
F	mg	0,15	0,3
Mo	µg	15	30
Se	µg	8,6	17,2
Cr	µg	10/15	20/30
I	µg	20	40
Λοιπά			
Καρβοτενοειδή	mg	0,30	0,60
Χολίνη	mg	55	110
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l	455/450	

Στην γεύση σοκολάτα όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αυτές επισημαίνονται με πορτοκαλί γραμματοσειρά

Fortimel Jucy

Σε μορφή Χυμού

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της υποθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια. **Υπερθερμιδικό** πόσιμο θρεπτικό σκεύασμα, **εμπλουτισμένο με πρωτεΐνη**, απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- 300kcal/ μπουκάλι (1,5kcal/ml).
- 7,8g πρωτεΐνη/ μπουκάλι.
- **Ελεύθερο εδωδιμων ινων και λιπαρων.**
- Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης.

Ενδείξεις και πιθανή διάγνωση

- Για τη διατροφική διαχείριση της υποθρεψίας σχετιζόμενης με ασθένεια.
- Αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις.
- Δίαιτα ελεύθερη λιπαρών ή εδωδιμων ινων.
- Θεραπεία νεφρικής αποκατάστασης (χαμηλής περιεκτικότητας μετάλλων).
- **Σύνδρομο βραχέως εντέρου, συρρίγνια, φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου***
- Προεγχειρητική προετοιμασία των υποθρεπτικών ασθενών.*
- Γαστρεκτομή ή άλλο χειρουργείο στομάχου.*
- Παγκρεατεκτομή ή παγκρεατίτιδα.
- Καρκίνος ήπατος.

*Έγκριμένο από την επιτροπή Advisory Committee on Borderline Substances, του Ηνωμένου Βασιλείου

Αντενδείξεις

Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Αποκλειστικά για εντερική χρήση, δεν προορίζεται για παρεντερική σίτιση. Ακατάλληλο για άτομα, που πάσχουν από γαλακτοζαϊμία και ασθενείς με αλλεργία στο γάλα αγελάδας.

Σημαντική Σημείωση

Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά 3-6 ετών.

Προτεινόμενη Δοσολογία

1-3 μπουκάλια την ημέρα συμπληρωματικά της καθημερινής διατροφής ή ακολουθώντας σύσταση Επαγγελματία Υγείας.

Γεύσεις

Μήλο, Πορτοκάλι

Συσκευασία

Μπουκάλι 200ml



Αρ.Γνωστού ΕΟΦ: FORTIMEL JUCY ΜΗΛΟ 62987/01-07-2021,
FORTIMEL JUCY ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 62220/30-06-2021
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100ml	ανά μερίδα (200 ml)
Ενέργεια	kJ	635	1270
	Kcal	150	300
Λιπαρά (0% Ενέργειας)	g	0	0
Εκ των οποίων Κορεσμένα	g	0	0
Υδατάνθρακες (89% Ενέργειας)	g	33,5	67,2
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	13,5	27
Λακτόζη	g	0,025	<0,025
Εδωδιμες Ίνες (0% Ενέργειας)	g	0	0
Πρωτεΐνη (11% Ενέργειας)	g	3,9	7,8
Αλάτι	g	0,02	0,04
Βιταμίνες			
A	μg	81,9	163,8
D	μg	1,3	2,6
E	mg(a-TE)	2,3	4,6
K	μg	10	20
Θειαμίνη	mg	0,29	0,58
Ριβοφλαβίνη	mg	0,32	0,64
Νιασίνη (2,94 mg NE)	mg	1,6	3,2
Παντοθενικό οξύ	mg	1	2
B6	mg	0,33	0,66
Φυλλικό οξύ	μg	41,3	82,6
B12	μg	0,6	1,2
Βιοτίνη	μg	6	12
C	mg	19	38
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	8,55	17,1
K	mg	9,69	19,38
Cl	mg	178	356
Ca	mg	25	50
P	mg	12	24
Mg	mg	1,64	3,28
Fe	mg	2,5	5
Zn	mg	1,8	3,6
Cu	mg	0,34	0,68
Mn	mg	0,15	0,3
F	mg	0,17	0,34
Mo	μg	9,8	19,6
Se	μg	8,7	17,4
Cr	μg	7,9	15,8
I	μg	24,9	49,8
Λοιπά			
Χολίνη	mg	68,8	137,6
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l	750	

Fortimel Forticare Sensations 2,4kcal/ml

Με Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

Περιγραφή
Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Για τη διαιτητική διαχείριση ασθενών με δυσθρεψία (υποθρεψία) υπό διατροφικό ρίσκο εμφάνισης αυτής, λόγω ασθένειας όπως **καρκίνος, χρόνια καταβολική νόσος ή καχεξία.**

- Βασικά Χαρακτηριστικά**
- Υπερθερμιδικό, 2,4 kcal/ml
 - Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, 14,6g/100ml (24% EN)
 - Ανά μερίδα 125ml: **1,1g Εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) & 0,73g Εικοσιδωδεκαενοϊκό οξύ (DHA)**, αναλογία EPA: DHA - 1,5:1.
 - Γεύσεις που αναπτύχθηκαν **ειδικά για τους ογκολογικούς ασθενείς**, που αντιμετωπίζουν αλλαγές στη γεύση¹
 - Με βάση τις **κατευθυντήριες οδηγίες** της ESPEN και της ESMO⁸⁻⁹
 - Ελεύθερο γλουτένης, φυτικών ινών
 - Κατάλληλο για σίτιση μέσω καθετήρα/στομίας

Ενδείξεις
Για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας), ή του ρίσκου εμφάνισης αυτής, σε ασθενείς με:

- **Καρκίνο**, με σχετιζόμενη απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας.^{2,3}
- **Χρόνια νόσο**, όπως Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Καρδιαγγειακή ή Νεφρική νόσο.⁴
- **Καχεξία**, που συχνά εμφανίζεται στο προχωρημένο στάδιο νόσων όπως πολλαπλές φλεγμονώδεις ασθένειες συγκεκριμένων οργάνων, νευρολογικές ασθένειες, ρευματοειδής αρθρίτιδα.⁵⁻⁷

- Αντενδείξεις**
- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 ετών.
 - Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαμία
 - Περιέχει **γάλα, σόγια, ψάρι**

Σημαντική Σημείωση

- Για εντερική χρήση μόνο
- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Δεν ενδείκνυται ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά άνω των 6 ετών
- Συνιστάται η παρακολούθηση της πρόσληψης υγρών για την διασφάλιση επαρκούς ενυδάτωσης.

Προτεινόμενη Δοσολογία

- **1-2 μπουκάλια** την ημέρα συμπληρωματικά της καθημερινής διατροφής ή ακολουθώς σύσταση Ιατρού ή Διαιτολόγου

Γεύσεις
Δροσιστικό Βατόμουρο
Δροσιστικό Μάνγκο/ Ροδάκινο

Συσκευασία
• Μπουκάλι 125ml



Αρ.Γνωστον. ΕΟΦ: FORTIMEL FORTICARE SENSATIONS 2,4KCAL (ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ, ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΓΚΟ/ΡΟΔΑΝΙΚΟ) 67587/06-06-2024. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. ESMO: European Society for Medical Oncology; ESPEN: European Society for Parenteral and Enteral Nutrition.

1. McGreevy et. al. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer 2014, 22(10):2635-2644. 2. Marin Caro MM et al. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2007, 26(3):289-301. 3.223. Fearon K et al. Nat Rev Clin Oncol 2013, 10(2):90-99. 4. Rahman A et al. JPEN Journal of parenteral and enteral nutrition 2016, 40(4):475-486 5. Scherbakov N et al. Journal of cachexia, sarcopenia and muscle 2018, 9(7):1189-1191. 6. De Brandt J et al. International journal of chronic obstructive pulmonary disease 2022, 17:2957-2976. 7. Beltrami M et al. World journal of cardiology 2021, 13(1):1-10. 8. Arends J, et al. Clin Nutr. 2017;6(1):11-48. 9. Arends J, et al. ESMO Open. 2021;6(3):100092.

		ανά 100ml	ανά μερίδα (125 ml)
Ενέργεια	kJ	1,029	1,3
	kcal	245	306,3
Λιπαρά (35% En)	g	9,6	12,0
Εκ των οποίων			
Κορεσμένα	g	2,2	2,8
Μονοακόρεστα	g	3,8	4,8
Πολυακόρεστα	g	3,5	4,4
Εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA)	mg	880	1100,0
Εικοσιδωδεκαενοϊκό οξύ (DHA)	mg	585	731,3
Υδατάνθρακες (41% En)	g	25,1	31,4
Εκ των οποίων			
Σάκχαρα	g	13,5/ 13,4	16,88/ 16,75
Λακτόζη	g	<0,35	<0,44
Εδώδιμες Ίνες (0% En)	g	0	0,0
Πρωτεΐνη (24% En)	g	14,6	18,3
Αλάτι	g	0,1	0,1
Βιταμίνες			
Βιτ. A	µg (RE/ER)	232	290,0
Βιτ. D	µg	7,85	9,8
Βιτ. E	mg (a-TE/ET)	4,09	5,1
Βιτ. K	µg	14	17,5
Θειαμίνη	mg	0,24	0,3
Ριβοφλαβίνη	mg	0,5	0,6
Νιασίνη	mg-NE	0,77	1,0
Παντοθενικό οξύ	mg	1,55	1,9
Βιτ. B6	mg	0,51	0,6
Φολικό οξύ	µg	35,4	44,3
Βιτ. B12	µg	1,04	1,3
Βιοτίνη	µg	10,6	13,3
Βιτ. C	mg	31,4	39,3
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	39,1	48,9
K	mg	98	122,5
Cl	mg	46,8	58,5
Ca	mg	336	420,0
P	mg	287	358,8
Mg	mg	54	67,5
Fe	mg	2,25/ 2,37	2,81/ 2,96
Zn	mg	2,3	2,9
Cu	µg	0,34	0,4
Mn	mg	0,24	0,3
F	mg	0,25	0,3
Mo	µg	14,7	18,4
Se	µg	13,4	16,8
Cr	µg	8,48	10,6
I	µg	30,5	38,1
Λοιπά			
Χολίνη	mg	99	123,8
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l	570	

Στην γεύση Δροσιστικό Βατόμουρο όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αυτές επισημαίνονται με πορτοκαλί γραμματοσειρά*

Fortimel Compact Protein 2.4kcal

Για τον πρόωρο κορεσμό

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Υπερπρωτεϊνικό, υπερθερμιδικό πόσιμο θρεπτικό σκεύασμα. Εμπλουτισμένο με όλες τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- **Υπερπρωτεϊνικό** (24% της ενέργειας)
- **Υπερθερμιδικό** (2,4 kcal/ml)
- Ελεύθερο γλουτένης
- **Χαμηλό σε όγκο**

Ενδείξεις

- Για τη διατροφική διαχείριση της υποθρεψίας σχετιζόμενης με ασθένεια
- Κατάλληλο για ασθενείς με αυξημένες ενεργειακές και πρωτεϊνικές απαιτήσεις
- Κατάλληλο για ασθενείς με δυσκολία στην κατανάλωση μεγάλου όγκου γεύματος ή για ασθενείς που παρουσιάζουν χαμηλή συμμόρφωση σε πόσιμα θρεπτικά σκευάσματα

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 ετών
- Για εντερική χρήση μόνο, δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση

Σημαντική Σημείωση

- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά 6-10 ετών
- Χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.

Προτεινόμενη Δοσολογία

- 1-3 μπουκάλια την ημέρα συμπληρωματικά της καθημερινής διατροφής ή ακολούθως της σύστασης Ιατρού ή Διαιτολόγου

Γεύσεις

- Βανίλια, μόκα, μπανάνα, κόκκινα φρούτα

Συσκευασία

- Μπουκάλι 125ml



Αρ.Γνωστον. ΕΟΦ: FORTIMEL COMPACT PROTEIN MOKA 87387/06-10-2014,
FORTIMEL COMPACT PROTEIN BANANIA 87387/06-10-2014,
FORTIMEL COMPACT PROTEIN ΜΠΑΝΑΝΑ 87387/06-10-2014,
FORTIMEL COMPACT ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 69968/28-06-2018
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100ml	ανά μερίδα (125 ml)
Ενέργεια	kJ	1029	1286,25
	Kcal	245	306
Λιπαρά (35 Εν%)	g	9,6	12
εκ των οποίων:			
Κορεσμένα	g	0,86	1,1
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	5,7	7,1
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	3	3,75
Υδατάνθρακες (41 Εν%)	g	25,1	31,4
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	13,7	17,1
Εκ των οποίων Λακτόζη	g	<0,35	0,44
Εδώδιμες ίνες (0 Εν%)	g	-	-
Πρωτεΐνη (24 Εν%)	g	14,6	18,25
Αλάτι	g	0,09	0,1
Βιταμίνες			
A	µg-Re	260	325
D	µg	2,08	2,6
E	mg-a-TE	5,61	7,0
K	µg	18,9	23,6
B1	mg	0,52	0,7
B2	mg	0,56	0,7
B3	mg-NE	4,12	5,2
B5	mg	1,53	1,9
B6	mg	0,61	0,8
Φυλλικό Οξύ	µg	80,9	101,1
B12	µg	0,9	1,1
Βιοτίνη	µg	10,1	12,6
C	mg	30,7	38,4
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	35	43,8
K	mg	97,6	122
Cl	mg	60	75
Ca	mg	350	437,5
P	mg	282	352,5
Mg	mg	54	67,5
Fe	mg	2,19	2,7
Zn	mg	2,58	3,2
Cu	mg	0,35	0,4
Mn	mg	0,64	0,8
F	mg	0,18	0,2
Mo	µg	21,5	26,9
Se	µg	15,4	19,2
Cr	µg	13	16,3
I	µg	49	61,3
Άλλα			
Χολίνη	mg	99,4	124,3
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l		570

Fortimel Peptide HEHP

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειλόμενης σε ασθένεια, σε ασθενείς με δυσαπορρόφηση και/ή ατελή πέψη.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Υπερθερμιδικό, 1,5 kcal/ml
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, 7,5g/100ml, 20% Εν
- Ημιστοιχειακό, με βάση τα πεπτίδια
- Περιεκτικότητα σε MCT, 60%
- Διατροφικά πλήρες
- Ελεύθερο γλουτένης, λακτόζης

Ενδείξεις

Για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειλόμενης σε ασθένεια, σε ασθενείς με δυσαπορρόφηση και/ή ατελή πέψη:

- Ανεπάρκεια παγκρεατικών ενζύμων¹⁻⁴
- Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (Νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα)⁵⁻⁷
- Καρκίνος γαστρεντερικού σωλήνα ή παρακείμενων οργάνων με αποτέλεσμα εντερίτιδα από ακτινοβολία Σύνδρομο βραχέως εντέρου¹⁰⁻¹¹
- Γαστρεντερικές διαταραχές σχετιζόμενες με τον HIV¹²

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών
- Ασθενείς με γαλακτοζαίμια
- Περιέχει γάλα και σόγια

Σημαντική Σημείωση

- Για εντερική χρήση μόνο.
- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Χρήση με προσοχή σε παιδιά 3-6 ετών

Προτεινόμενη δοσολογία

- 2 μπουκάλια την ημέρα συμπληρωματικά της καθημερινής διατροφής ή
- 5 μπουκάλια την ημέρα ως αποκλειστική πηγή διατροφής ή
- Ακολουθώντας σύσταση Ιατρού ή Διαιτολόγου



Γεύσεις

- Καφέ

Συσκευασία

- Μπουκάλι 200ml

Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: FORTIMEL PEPTIDE HEHP (ΚΑΦΕΣ) 71054/29-06-2023
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

¹Meier R, et al. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2006; 25(2): 275-84. 2.Kumar A et al. Journal of clinical gastroenterology 2006; 40(5): 431-4. 3.Tiengou LE et al. JPEN Journal of parenteral and enteral nutrition 2006; 30(1): 1-5. 4.Garcia de Casasola G et al. Medicina clinica 2008; 130(13): 492-3. 5.Heuschkel RB et al. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition 2000; 31(1): 8-15. 6.O'Sullivan M, O'Morain C et al. Best practice & research Clinical gastroenterology 2006; 20(3): 561-73. 7.Smith P. World journal of gastroenterology 2008; 14(27): 4420-3. 8.Beer WH et al. The American journal of clinical nutrition 1985; 41(1): 85-91. 9.Bounous G. Surgery 1989; 105(5): 571-5. 10.Cosmes J, et al. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif) 1992; 8(6): 406-11. 11.de Luis Roman et al. European journal of clinical nutrition 2001; 55(12): 1048-52. 12.Ockenga J et al. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2006; 25(2): 319-29.

		ανά 100ml	ανά μερίδα (200 ml)
Ενέργεια	kJ	634	1268
	kcal	150	300
Λιπαρά (30% Εν)	g	5	10
Εκ των οποίων			
Κορεσμένα	g	3,5	7
MCT	g	3	6
Υδατάνθρακες (50% Εν)	g	18,8	37,6
Εκ των οποίων			
Σάκχαρα	g	4,1	8,2
Λακτόζη	g	0,01	0,02
Εδώδιμες Ίνες (0% Εν)	g	0,28	0,56
Πρωτεΐνη (20% Εν)	g	7,5	15
Αλάτι	g	0,49	0,98
Βιταμίνες			
Βιτ. A	μg RE/ER	123	246
Βιτ. D	μg	2,01	4,02
Βιτ. E	mg(a-TE/ET)	1,94	3,88
Βιτ. K	μg	8,07	16,14
Θειαμίνη	mg	0,22	0,44
Ριβοφλαβίνη	mg	0,26	0,52
Νιασίνη	mg (2,96 mg NE/EN)	0,12	0,24
Παντοθενικό οξύ	mg	0,76	1,52
Βιτ. B6	mg	0,25	0,5
Φολικό οξύ	μg	30,1	60,2
Βιτ. B12	μg	0,64	1,28
Βιοτίνη	μg	5,69	11,38
Βιτ. C	mg	15,1	30,2
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	197	394
K	mg	341	682
Cl	mg	59,8	119,6
Ca	mg	97,3	194,6
P	mg	96,9	193,8
Mg	mg	29,9	59,8
Fe	mg	2,33	4,66
Zn	mg	1,7	3,4
Cu	mg	0,25	0,5
Mn	μg	93,8	187,6
F	mg	0,14	0,28
Mo	μg	16,9	33,8
Se	μg	9,99	19,98
Cr	μg	9,52	19,04
I	μg	18,5	37
Λοιπά			
L-Καρνιτίνη	mg	15,1	30,2
Χολίνη	mg	55,5	111
Ταυρίνη	mg	15,1	30,2
Οσμωτικότητα	mOsmol/l	445	

Fortimel Crème Protein 1,6kcal/ml

Θρεπτικό σκεύασμα σε ημιστέρεα μορφή

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειλόμενης σε ασθένεια.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Υπερθερμιδικό, 1,6 kcal/ml
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, 12g/ κύπελλο 125g (24% EN)
- Διατροφικά πλήρες
- Ελεύθερο γλουτένης

Ενδείξεις

- Για την κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια, πρωτεΐνη και μικροθρεπτικά συστατικά ασθενών με δυσθρεψία (υποθρεψία) οφειλόμενη σε ασθένεια.

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών
- Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά άνω των 3 ετών
- Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαιμία
- Περιέχει γάλα

Σημαντική Σημείωση

- Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Για εντερική χρήση μόνο
- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη

Προτεινόμενη Δοσολογία

- 1-3 κύπελλα** την ημέρα συμπληρωματικά της καθημερινής διατροφής
- 8-10 κύπελλα** την ημέρα ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Ή ακολουθώς σύστασης Ιατρού ή Διαιτολόγου.

Γεύσεις

- Βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα.

Συσκευασία

- Κύπελλο, 125g



Αρ.Γνωστον. ΕΟΦ: FORTIMEL CRÈME PROTEIN 1,6KCAL
(ΒΑΝΙΛΙΑ, ΜΠΑΝΑΝΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΑ) 68780/10-06-2024
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

1. Atkinson FS

		ανά 100ml	ανά μερίδα (125 ml)
Ενέργεια	kJ	675	843,8
	kcal	160	200,0
Λιπαρά (28% En)	g	5,1	6,4
Εκ των οποίων			
Κορεσμένα	g	0.59/ 0.77	0.74 / 0.96
Υδατάνθρακες (48% En/47%En)	g	19.1/ 18.9	23.9 / 23.6
Εκ των οποίων			
Σάκχαρα	g	10.7/ 10.6	13.4/ 13.3
Λακτόζη	g	0.044/0.042	0.055/0.053
Εδώδιμες Ίνες (0% En/1%EN)	g	<0.5/ 0.74	0.625/ 0.93
Πρωτεΐνη (24% En)	g	9,6	12,0
Αλάτι	g	0,19	0,2
Βιταμίνες			
Βιτ. A	µg	140	175,0
Βιτ. D	µg	2,08	2,6
Βιτ. E	mg (a-TE/ET)	2.33/ 2.25	2.91/ 2.81
Βιτ. K	µg	9.29/ 9.11	11.6/ 11.38
Θειαμίνη	mg	0,27	0,3
Ριβοφλαβίνη	mg	0,29	0,4
Νιασίνη	mg (3.94 mg NE/EN)	1.40/ 1.45	1.75/ 1.81
Παντοθενικό οξύ	mg	0,89	1,1
Βιτ. B6	mg	0,3	0,4
Φολικό οξύ	µg	42,8	53,5
Βιτ. B12	µg	0.59/ 0.57	0.74/ 0.71
Βιοτίνη	µg	6,3	7,9
Βιτ. C	mg	16,2	20,3
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	75.4/ 77.6	94.3/ 97
K	mg	258/ 287	322.5/ 358.75
Cl	mg	61.3/ 63.8	76.63/ 79.75
Ca	mg	117/ 114	146.3/ 142.5
P	mg	122/ 121	152.5/ 151.25
Mg	mg	19.2/ 22	24/ 27.5
Fe	mg	2.32/ 2.43	2.9/ 3.03
Zn	mg	1.47/ 1.34	1.84/ 1.68
Cu	µg	0,29	0,36
Mn	mg	0.15/ 0.19	0.19/ 0.24
F	mg	0.13/ 0.1	0.16/ 0.13
Mo	µg	12.7/ 10.8	15.9/ 13.5
Se	µg	10.6/ 8.98	13.25/ 11.23
Cr	µg	8.4/ 12	10.5/ 15
I	µg	28.6/ 28.1	35.8/ 35.13
Λοιπά			
Χολίνη	mg	87,7	109,6
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l	580/ 630	

Στην γεύση σοκολάτα όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αυτές επισημαίνονται με πορτοκαλί γραμματοσειρά

Fortimel Powder

Ιδανικό και για ανάμιξη με τρόφιμα

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Ισοθερμιδικό, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, θρεπτικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης. Εμπλουτισμένο με τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Υπερπρωτεϊνικό (20% της ενέργειας)
- Ισοθερμιδικό (1kcal/ml)
- Ελεύθερο γλουτένης

Ενδείξεις

- Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Για τη διατροφική διαχείριση της υποθρεψίας σχετιζόμενης με ασθένεια
- Κατάλληλο για ασθενείς με αυξημένες ενεργειακές και πρωτεϊνικές απαιτήσεις
- Κατάλληλο για ασθενείς με δυσκολία σίτισης και μειωμένη όρεξη
- Μπορεί να προστεθεί σε γλυκά, φαγητά και ροφήματα

Αντενδείξεις

- Χρήση μόνο για ενήλικες
- Για εντερική χρήση μόνο, δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση

Σημαντική Σημείωση

- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη

Προτεινόμενη Δοσολογία

- 8 μεζούρες σκόνη σε παρασκευασμένο τρόφιμα, γάλα ή άλλα ροφήματα, ζεστά ή κρύα. Αναμειγνύετε 170 ml υγρού με 8 μεζούρες σκόνης και ανακατέψτε έως ότου η σκόνη να διαλυθεί τελείως. Συμπληρώστε με νερό μέχρι να φτάσετε τα 200ml.

Γεύσεις

- Ουδέτερη

Συσκευασία

- Κουτί 335g



		ανά 100gr	ανά 200 ml (46g σκόνης)
Ενέργεια	kJ	1830	841,8
	Kcal	435	200
Λιπαρά (30 Εν%)	g	14,4	6,6
εκ των οποίων:			
Κορεσμένα	g	3,4	1,6
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	8	3,7
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	2,3	1
Υδατάνθρακες (49 Εν%)	g	53,4	24,6
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	8,6	4
Εκ των οποίων Λακτόζη	g	0,9	0,4
Εδώδιμες ίνες (1 Εν%)	g	2,6	1,2
Πρωτεΐνη (20 Εν%)	g	21,8	10
Αλάτι	g	0,79	0,36
Βιταμίνες			
A	µg-Re	419	192
D	µg	6,5	3
E	mg-a-TE	5,2	2,4
K	µg	23	10,4
B1	mg	0,58	0,26
B2	mg	0,73	0,34
B3	mg-NE	4,2	1,94
B5	mg	2,3	1,06
B6	mg	0,73	0,34
Φυλλικό Οξύ	µg	112	52
B12	µg	1,2	0,54
Βιοτίνη	µg	12	5,4
C	mg	44	20
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	314	144
K	mg	693	318
Cl	mg	392	180
Ca	mg	519	238
P	mg	281	130
Mg	mg	74	34
Fe	mg	7	3,2
Zn	mg	5,2	2,4
Cu	mg	0,8	0,4
Mn	mg	1,3	0,6
F	mg	0,45	0,2
Mo	µg	44	20
Se	µg	26	12
Cr	µg	20	9,2
I	µg	56	26
Άλλα			
Χολίνη	mg	150	68
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l		330

Diasip

Κατάλληλο για διαβητικούς ασθενείς

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Εμπλουτισμένο με όλες τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- **Ισοθερμιδικό** (1,04 kcal/ml)
- **Διατροφικά πλήρες**
- Ελεύθερο γλουτένης
- **Γλυκαιμικός δείκτης: 31**
- **Γλυκαιμικό φορτίο: 7**
- Εμπλουτισμένο με εδώδιμες ίνες

Ενδείξεις

- Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Για τη διατροφική διαχείριση της υποθρεψίας που σχετίζεται με ασθένεια
- Κατάλληλο για ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη και Υπεργλυκαιμία

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών
- Για εντερική χρήση μόνο, δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση
- Ακατάλληλο για ασθενείς που πάσχουν από φρουκτοζαιμία

Σημαντική Σημείωση

- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά 3-6 ετών

Προτεινόμενη Δοσολογία


- Ως αποκλειστική πηγή διατροφής 7-10 μπουκάλια την ημέρα, ως συμπληρωματική διατροφή 1-3 μπουκάλια την ημέρα ή ακολούθως σύστασης Ιατρού ή Διαιτολόγου

Γεύσεις

- Βανίλια

Συσκευασία

- Μπουκάλι 200ml



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: DIASIP BANIAIA 65998/14-10-2008
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100ml	ανά μερίδα (200 ml)
Ενέργεια	kJ	438	876
	Kcal	104	208
Λιπαρά (33 Εν%)	g	3,8	7,6
εκ των οποίων:			
Κορεσμένα	g	0,44	0,88
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	2,2	4,4
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	1,1	2,2
Υδατάνθρακες (44 Εν%)	g	11,5	23
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	8,4	16,8
Εκ των οποίων Λακτόζη	g	3,54	7,1
Εδώδιμες ίνες (5 Εν%)	g	2,5	5
Πρωτεΐνη (19 Εν%)	g	4,9	9,8
Αλάτι	g	0,13	0,26
Βιταμίνες			
A	μg-Re	79,1	158,2
D	μg	1,29	2,6
E	mg-a-TE	2,5	5
K	μg	5,52	11,0
B1	mg	0,4	0,8
B2	mg	0,26	0,5
B3	mg-NE	1,9	3,8
B5	mg	0,91	1,8
B6	mg	0,34	0,6
Φυλλικό Οξύ	μg	38	76
B12	μg	0,55	1,1
Βιοτίνη	μg	6,38	12,7
C	mg	15	30
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	50,1	100,2
K	mg	99,6	199,2
Cl	mg	42,8	85,6
Ca	mg	53,5	107
P	mg	49,6	99,2
Mg	mg	22,2	44,4
Fe	mg	1,65	3,3
Zn	mg	1,27	2,5
Cu	mg	0,2	0,4
Mn	mg	0,33	0,66
F	mg	0,1	0,2
Mo	μg	10	20
Se	μg	7,5	15
Cr	μg	12	24
I	μg	15,7	31,4
Άλλα			
Χολίνη	mg	49,8	99,6
Καροτενοειδή	mg	0,16	0,32
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l	365	

Souvenaid

Κατάλληλο για το αρχικό στάδιο της νόσου Alzheimer.

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς με Fortasyn Connect, ένα μίγμα θρεπτικών συστατικών που αποδεδειγμένα βελτιώνει τη μνήμη στα αρχικά στάδια της νόσου Alzheimer¹⁻³.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Περιέχει το Fortasyn Connect, μίγμα θρεπτικών συστατικών, όπως ουριδίνη, χολίνη, Ω3, βιταμίνες και μέταλλα.
- Ειδικά σχεδιασμένο να προάγει το σχηματισμό των συνάψεων.
- Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης.

Ενδείξεις

- Για τη διατροφική διαχείριση ασθενών στο πρώιμο στάδιο της νόσου Alzheimer, συμπεριλαμβανομένης της ήπιας νοητικής διαταραχής (MCI).

Αντενδείξεις

Ακατάλληλο για άτομα με γαλακτοζαϊμία.

Κλινικά Δεδομένα

- Τρεις δημοσιευμένες κλινικές μελέτες.
- Οφέλη στη **νόηση** και τη **λειτουργικότητα**, τη **μνήμη** και τον **όγκο του ιππόκαμπου** στον εγκέφαλο.¹⁻³

Σημαντική σημείωση

Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη.

Προτεινόμενη Δοσολογία

1 μπουκάλι 125ml την ημέρα, συμπληρωματικά της καθημερινής διατροφής ή βάση των οδηγιών του Ιατρού.

Γεύσεις

Βανίλια, Φράουλα

Συσκευασία

Μπουκάλι 125ml



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: SOUVENOID ΒΑΝΙΛΙΑ 94197/09-12-2013,
SOUVENOID ΦΡΑΟΥΛΑ 94197/09-12-2013
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

1. Soininen H, et al. Lancet Neurol. 2017;16:965-75
2. Cummings J, et al. Alzheimers Res Ther. 2019;11
3. Soininen H, et al. Alzheimers Dement. 2020; in press

		ανά 100ml	ανά μερίδα (125ml)
Ενέργεια	kJ	421	526,3
	kcal	100	125,0
Λιπαρά (39 Εν%)	g	4,3	5,4
Κορεσμένα	g	1,5	1,9
Μονοακόρεστα	g	0,95	1,2
Πολυακόρεστα	g	1,8	2,3
ΕΡΑ*	mg	240	300,0
DHA*	mg	960	1200,0
Υδατάνθρακες (50 Εν%)	g	12,3	15,4
Σάκχαρα	g	6,4	8,0
Λακτόζη	g	<0,025	<0,025
Εδώδιμες ίνες (1 Εν%)	g	0,55	0,7
Πρωτεΐνη (10 Εν%)	g	2,6	3,3
Αλάτι	g	0,25	0,3
Βιταμίνες			
A	μg	160	200,0
D	μg	0,8	1,0
E*	mg (a-TE/ET)	32	40,0
K	μg	6,17	7,7
Θειαμίνη	mg	0,15	0,2
Ριβοφλαβίνη	mg	0,17	0,2
Νιασίνη	mg	1,06	1,3
	mg NE/EN	1,8	2,3
Παντοθενικό οξύ	mg	0,53	0,7
B6*	mg	0,8	1,0
Φυλλικό οξύ*	μg	320	400,0
B12*	μg	2,4	3,0
Βιοτίνη	μg	4	5,0
C*	mg	64	80,0
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			0,0
Na	mg	100	125,0
K	mg	100	125,0
Cl	mg	116	145,0
Ca	mg	80	100,0
P	mg	70	87,5
PO ₄	mg	217	271,3
Mg	mg	20	25,0
Fe	mg	1,6	2,0
Zn	mg	1,2	1,5
Cu	mg	0,18	0,2
Mn	mg	0,33	0,4
Mo	μg	10	12,5
Se*	μg	48	60,0
Cr	μg	6,8	8,5
I	μg	16	20,0
Λοιπά			
5'-μονοφωσφορική ουριδίνη*	mg	500	625,0
Χολίνη*	mg	320	400,0
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l	427	533,8

Τα θρεπτικά συστατικά* που συνθέτουν το Fortasyn Connect

Calogen

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Υπερθερμιδικό θρεπτικό σκεύασμα που περιέχει τριγλυκερίδια μακράς αλυσού (LCT).

Βασικά χαρακτηριστικά

- **Υπερθερμιδικό** (4,5 kcal/ml).
- **Λίπος** (100% της ενέργειας).
- Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης
- Ελεύθερο εδωδιμων ινών.

Ενδείξεις

- Υποθρεψία που σχετίζεται με ασθένεια
- Για τη διατροφική διαχείριση καταστάσεων, που απαιτείται υψηλή πρόσληψη ενέργειας.
- Κατάλληλο για ασθενείς με περιορισμό υγρών.
- Κατάλληλο για ασθενείς σε κετογονική διαίτα.
- Κατάλληλο για ασθενείς με νεφρικές παθήσεις.

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο ως πηγή αποκλειστικής διατροφής.
- Ακατάλληλο για παρεντερική χρήση.

Σημαντική Σημείωση

- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Χορηγείται με προσοχή σε παιδιά κάτω των 6 ετών.

Προτεινόμενη δοσολογία

- Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 3x30 ml την ημέρα ή ακολούθως σύστασης ιατρού ή διαιτολόγου.
- Μπορεί να απαιτείται αραίωση για παιδιά κάτω των 5 ετών.

Γεύσεις

- Ουδέτερη.

Συσκευασία

- Μπουκάλι 200ml.



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: CALOGEN 61633/24-09-2007
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100ml	ανά μερίδα (30 ml)
Ενέργεια	kJ	1850	555
	Kcal	450	135
Λιπαρά (100 Εν%)	g	50	15
εκ των οποίων:			
Κορεσμένα	g	5,3	1,6
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	30,4	9,1
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	14,3	4,29
Υδατάνθρακες (0,1 Εν%)	g	0,1	0
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	-	-
Εκ των οποίων Λακτόζη	g	-	-
Εδώδιμες ίνες (0 Εν%)	g	-	-
Πρωτεΐνη (0 Εν%)	g	-	-
Αλάτι	g	0,02	0
Βιταμίνες			
A	µg-RE	-	-
D	µg	-	-
E	mg-a-TE	-	-
K	µg	-	-
B1	mg	-	-
B2	mg	-	-
B3	mg-NE	-	-
B5	mg	-	-
B6	mg	-	-
Φυλλικό οξύ	µg	-	-
B12	µg	-	-
Βιοτίνη	µg	-	-
C	mg	-	-
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	7	2,1
K	mg	-	-
Cl	mg	0,1	0,03
Ca	mg	-	-
P	mg	-	-
Mg	mg	-	-
Fe	mg	-	-
Zn	mg	-	-
Cu	mg	-	-
Mn	mg	-	-
F	mg	-	-
Mo	µg	-	-
Se	µg	-	-
Cr	µg	-	-
I	µg	-	-
Άλλα			
Χολίνη	mg	-	-

Protifar

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

Υπερπρωτεϊνικό θρεπτικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- **Υπερπρωτεϊνικό** (95% της ενέργειας)
- Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης

Ενδείξεις

- Υποθρεψία που σχετίζεται με ασθένεια
- Κατάλληλο για τη διαιτητική αντιμετώπιση της υποπρωτεϊναιμίας
- Κατάλληλο για ασθενείς που αδυνατούν να καλύψουν τις πρωτεϊνικές τους ανάγκες με τη συμβατική διατροφή
- Μπορεί να προστεθεί σε γλυκά, φαγητά και ροφήματα

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών
- Για εντερική χρήση μόνο, δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση
- Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαμία

Σημαντική Σημείωση

- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη

Προτεινόμενη Δοσολογία

Μία μεζούρα (2,5g) περιέχει περίπου 2,2 g πρωτεΐνης. Ανακατεύετε την απαιτούμενη ποσότητα Protifar με χλιαρό υγρό μέχρι να ομογενοποιηθεί. Προσθέστε το ομογενοποιημένο μίγμα μέσα σε φαγητό ή ρόφημα.

Συσκευασία

Κουτί 225g



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: PROTIFAR 81732/13-11-2009
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100g
Ενέργεια	kJ	1560
	Kcal	368
Λιπαρά (4 Εν%)	g	1,6
εκ των οποίων:		
Κορεσμένα	g	1,2
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	0,4
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	-
Υδατάνθρακες (1 Εν%)	g	1,2
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	1,2
Εκ των οποίων Λακτόζη	g	1,2
Εδώδιμες ίνες (0 Εν%)	g	-
Πρωτεΐνη (95 Εν%)	g	87,2
Αλάτι	g	0,25
Βιταμίνες		
A	µg-RE	-
D	µg	-
E	mg-a-TE	-
K	µg	-
B1	mg	-
B2	mg	-
B3	mg-NE	-
B5	mg	-
B6	mg	-
Φυλλικό οξύ	µg	-
B12	µg	-
Βιοτίνη	µg	-
C	mg	-
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία		
Na	mg	110
K	mg	140
Cl	mg	80
Ca	mg	1350
P	mg	700
Mg	mg	≤20
Fe	mg	-
Zn	mg	-
Cu	mg	-
Mn	mg	-
F	mg	-
Mo	µg	-
Se	µg	-
Cr	µg	-
I	µg	-
Άλλα		
Χολίνη	mg	-
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l	25

Elemental 028 Extra

Στοιχειακό σκεύασμα

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Στοιχειακό πόσιμο θρεπτικό σκεύασμα. Εμπλουτισμένο με όλες τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Διαθέσιμο σε δύο μορφές, σκόνη και υγρό διάλυμα.

Βασικά χαρακτηριστικά

- 100% ελεύθερα αμινοξέα.
- Διατροφικά πλήρες.
- Ελεύθερο γλουτένης.
- Ελεύθερο πρωτεΐνης γάλακτος.

Ενδείξεις

- Για τη διαιτητική διαχείριση ασθενών με σοβαρή δυσλειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα, όπως φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, σύνδρομο βραχέως εντέρου, δυσεπίλυτο πρόβλημα δυσαπορρόφησης ή εντερικά συρίγγια.
- Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής από την ηλικία των 5 ετών.
- Κατάλληλο ως συμπληρωματική διατροφή για παιδιά άνω του 1 έτους.
- Η σκόνη είναι κατάλληλη και για σίτιση μέσω καθετήρα.

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για βρέφη ηλικίας κάτω του 1 έτους.
- Ακατάλληλο για παρεντερική χρήση.

Σημαντική σημείωση

- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη.

Προτεινόμενη δοσολογία

- Η δοσολογία πρέπει να καθορίζεται ακολούθως σύστασης ιατρού ή διαιτολόγου και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς.

Γεύσεις

- Υγρό: Πορτοκάλι-Ανανάς
- Σκόνη: Πορτοκάλι

Συσκευασία

- Υγρό: Tetrapack 250ml
- Σκόνη: Φάκελος 100g



		ανά 100g σκόνης	ανά 100 ml	ανά μερίδα 250ml
Ενέργεια	kJ	1793	360	900
	Kcal	427	86	215
Λιπαρά	g	17,45	3,5	8,8
εκ των οποίων:				
Κορεσμένα	g	6,7	1,3	3,3
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	7,4	1,6	3,8
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	2,4	0,45	1,3
Υδατάνθρακες	g	55	11	27,5
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	23,3	4,7	11,8
Εκ των οποίων Λακτόζη	g	<0,1	-	-
Εδώδιμες ίνες	g	-	-	-
Ισοδύναμο Πρωτεΐνης	g	12,5	2,5	6,3
Αλάτι	g	0,8	0,15	0,5
Βιταμίνες				
A	µg-RE	330	40	100
D	µg	2,5	0,48	1,2
E	mg-a-TE	6,1	1,7	4,3
K	µg	25	5,0	12,5
B1	mg	0,6	0,12	0,3
B2	mg	0,6	0,12	0,3
B3	mg-NE	9	2	5
B5	mg	2	0,4	1
B6	mg	0,8	0,16	0,4
Φυλλικό οξύ	µg	83,3	16,7	41,8
B12	µg	1,7	0,4	4,1
Βιοτίνη	µg	18	3,6	9
C	mg	28,3	5,7	14,3
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία				
Na	mg	305	61	152,5
K	mg	466	93,2	233
Cl	mg	333	66,6	166,5
Ca	mg	245	45	112,5
P	mg	200	40	100
Mg	mg	81,6	16,3	40,8
Fe	mg	4,2	0,84	2,1
Zn	mg	4,2	0,84	2,1
Cu	mg	0,4	0,8	0,2
Mn	mg	0,6	0,12	0,3
F	mg	-	-	-
Mo	µg	33,3	6,66	16,7
Se	µg	15	3	7,5
Cr	µg	15	3	7,5
I	µg	33,3	6,66	16,7
Άλλα	-	-	-	-
Χολίνη	mg	91,6	18,3	45,8
Ινοσιτόλη	mg	9	1,8	4,5
Ωσμωτικότητα	mOsmol/kg		725	

MCT Oil

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Θρεπτικό σκεύασμα αποτελούμενο από τριγλυκερίδια μέσης αλύσου.

Βασικά χαρακτηριστικά

- **100% καθαρά MCTs.**
- Κατάλληλο και για χορήγηση μέσω καθετήρα.

Ενδείξεις

- Για την διαιτητική διαχείριση καταστάσεων όπου η απορρόφηση λιπαρών οξέων ή ο μεταβολισμός λιπαρών οξέων μακράς αλύσου (LCT) είναι μειωμένος και ενδείκνυται υψηλή πρόσληψη τριγλυκεριδίων μέσης αλύσου (MCT)
- Για τη διαιτητική διαχείριση ασθενειών, που θα ωφεληθούν από κετογονική διαίτα

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για παρεντερική χρήση.

Σημαντική σημείωση

- Μόνο για εντερική χρήση
- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Ακατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες

Προτεινόμενη δοσολογία

- Η προτεινόμενη δοσολογία πρέπει να καθορίζεται από τον ιατρό ή τον διαιτολόγο και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς.

Γεύσεις

- Ουδέτερη.

Συσκευασία

- Μπουκάλι 500ml.



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: MCT OIL MODULE 13350/94/06-04-1995
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100ml
Ενέργεια	kJ	3515
	Kcal	855
Λιπαρά (100 Εν%)	g	95
εκ των οποίων:		
Κορεσμένα	g	95
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	-
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	-
Υδατάνθρακες (0 Εν%)	g	-
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	-
Εκ των οποίων Λακτόζη	g	-
Εδώδιμες ίνες (0 Εν%)	g	-
Πρωτεΐνη (0 Εν%)	g	-
Αλάτι	g	-
Βιταμίνες		
A	µg-RE	-
D	µg	-
E	mg-a-TE	-
K	µg	-
B1	mg	-
B2	mg	-
B3	mg-NE	-
B5	mg	-
B6	mg	-
Φυλλικό οξύ	µg	-
B12	µg	-
Βιοτίνη	µg	-
C	mg	-
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία		
Na	mg	-
K	mg	-
Cl	mg	-
Ca	mg	-
P	mg	-
Mg	mg	-
Fe	mg	-
Zn	mg	-
Cu	mg	-
Mn	mg	-
F	mg	-
Mo	µg	-
Se	µg	-
Cr	µg	-
I	µg	-
Άλλα		
Χολίνη	mg	-

Nutrison

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Διατροφικά πλήρες θρεπτικό σκεύασμα, έτοιμο προς χρήση για σίτιση μέσω καθετήρα/στομίας. Εμπλουτισμένο με όλες τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- **Ισοθερμιδικό** (1kcal/ml)
- **Διατροφικά πλήρες**
- Περιέχει EPA & DHA
- Με το κατοχυρωμένο μίγμα πρωτεϊνών p4
- Ελεύθερο γλουτένης
- Ελεύθερο λακτόζης
- Χωρίς πρόσθετες εδώδιμες ίνες

Ενδείξεις

- Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Για την διαιτητική διαχείριση υποθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, σε ασθενείς όπου απαιτείται εντερική σίτιση

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών
- Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαμία
- Για εντερική χρήση μόνο, δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση

Σημαντική Σημείωση

- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά άνω των 3 ετών

Προτεινόμενη Δοσολογία

- 3-4 μπουκάλια την ημέρα ή ακολούθως σύστασης Ιατρού ή Διαιτολόγου

Συσκευασία

- Μπουκάλι 500ml



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: NUTRISON 62058/05-08-2013
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100ml	ανά μερίδα (500 ml)
Ενέργεια	kJ	420	2100
	Kcal	100	500
Λιπαρά (35% Ενέργειας)	g	3,9	19,5
εκ των οποίων:			
Κορεσμένα	g	4,8	24
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	2,1	10,5
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	1,3	6,5
εκ των οποίων:			
EPA	mg	19,6	98
DHA	mg	13,4	67
Υδατάνθρακες (49% Ενέργειας)	g	12,4	62
Εκ των οποίων σάκχαρα:	g	0,81	4,05
Εκ των οποίων λακτόζη:	g	< 0,025	
Εδώδιμες ίνες (0% Ενέργειας)	g	0	0
Πρωτεΐνη (16% Ενέργειας)	g	4	20
Αλάτι	g	0,23	1,15
Βιταμίνες			
A	μg-RE	82	410
D	μg	1,7	8,5
E	mg-a-TE	1,36	6,8
K	μg	8	40
B1	mg	0,2	1
B2	mg	0,3	1,5
B3	mg-NE	1,81	9,05
B5	mg	0,42	2,1
B6	mg	0,3	1,5
Φυλλικό οξύ	μg	24	120
B12	μg	0,4	2
Βιοτίνη	μg	3	15
C	mg	13	65
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	90	450
K	mg	150	750
Cl	mg	120	600
Ca	mg	80	400
P	mg	60	300
Mg	mg	20,8	104
Fe	mg	1,59	7,95
Zn	mg	1	5
Cu	μg	0,15	0,75
Mn	mg	0,15	0,75
F	mg	0,12	0,6
Mo	μg	11	55
Se	μg	5,7	28,5
Cr	μg	6	30
I	μg	14	70
Λοιπά			
Καροτενοειδή	mg	0,2	1
Χολίνη	mg	37	185
Οσμωτικότητα	mOsmol/l	270	

Nutrison Multi Fibre

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Διατροφικά πλήρες θρεπτικό σκεύασμα, έτοιμο προς χρήση για σίτιση μέσω καθετήρα/στομίας. Εμπλουτισμένο με εδώδιμες ίνες, όλες τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- **Ισοθερμιδικό** (1,03 kcal/ml)
- **Διατροφικά πλήρες**
- Περιέχει EPA & DHA
- Με το μίγμα πρωτεϊνών P4, της Nutricia
- Με το μίγμα εδωδιμων ινων MF6, της Nutricia διαλυτών και μη διαλυτών
- Ελεύθερο γλουτένης
- Ελεύθερο λακτόζης

Ενδείξεις

- Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Για την διαιτητική διαχείριση υποθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, όπου απαιτείται εντερική σίτιση

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών
- Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαμία
- Ακατάλληλο για ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα ελεύθερη εδωδιμων ινων
- Για εντερική χρήση μόνο, δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση

Σημαντική Σημείωση


- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Χορηγείται με προσοχή σε παιδιά άνω των 3 ετών

Προτεινόμενη Δοσολογία

- 3-4 μπουκάλια την ημέρα ή ακολούθως σύστασης Ιατρού ή Διαιτολόγου

Συσκευασία

- Μπουκάλι 500ml



Αρ.Γνωστον. ΕΟΦ: NUTRISON MULTIFIBRE 62057/05-08-2013
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100ml	ανά μερίδα (500 ml)
Ενέργεια	kJ		2165
	Kcal	103	515
Λιπαρά (34% Ενέργειας)	g	3,9	19,5
εκ των οποίων:			
Κορεσμένα	g	0,48	2,4
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	2,1	10,5
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	1,3	6,5
εκ των οποίων:			
EPA	mg	20,2	101
DHA	mg	13,8	69
Υδατάνθρακες (48% Ενέργειας)	g	12,3	61,5
Εκ των οποίων σάκχαρα:	g	0,88	4,4
Εκ των οποίων λακτόζη:	g	< 0,025	
Εδώδιμες ίνες (3% Ενέργειας)	g	1,5	7,5
Πρωτεΐνη (16% Ενέργειας)	g	4	20
Αλάτι	g	0,22	1,1
Βιταμίνες			
A	μg-RE	79,6	398
D	μg	1,65	8,25
E	mg-a-TE	1,32	6,6
K	μg	7,77	38,85
B1	mg	0,19	0,95
B2	mg	0,29	1,45
B3	mg-NE	0,91	4,55
B5	mg	0,42	2,1
B6	mg	0,3	1,5
Φυλλικό οξύ	μg	24	120
B12	μg	0,4	2
Βιοτίνη	μg	3	15
C	mg	13	65
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	90	450
K	mg	150	750
Cl	mg	120	600
Ca	mg	80	400
P	mg	60	300
Mg	mg	20,8	104
Fe	mg	1,59	7,95
Zn	mg	1	5
Cu	μg	0,15	0,75
Mn	mg	0,15	0,75
F	mg	0,11	0,55
Mo	μg	11	55
Se	μg	5,7	28,5
Cr	μg	6	30
I	μg	14	70
Λοιπά			
Καροτενοειδή	mg	0,2	1
Χολίνη	mg	37	185
Οσμωτικότητα	mOsmol/l	270	

Nutrison Energy

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Διατροφικά πλήρες, υπερθερμιδικό θρεπτικό σκεύασμα, έτοιμο προς χρήση για σίτιση μέσω καθετήρα/στομίας. Εμπλουτισμένο με όλες τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Υπερθερμιδικό (1,5kcal/ml)
- Διατροφικά πλήρες
- Περιέχει EPA & DHA
- Με το μίγμα πρωτεϊνών P4, της Nutricia
- Ελεύθερο γλουτένης
- Ελεύθερο λακτόζης
- Χωρίς πρόσθετες εδώδιμες ίνες

Ενδείξεις

- Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής
- Δυσθρεψία που σχετίζεται με ασθένεια
- Για την κάλυψη υψηλών ενεργειακών αναγκών

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών
- Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαιμία
- Για εντερική χρήση μόνο, δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση

Σημαντική Σημείωση

- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Χορηγείται με προσοχή σε παιδιά άνω των 3 ετών

Προτεινόμενη Δοσολογία

- 3-4 μπουκάλια την ημέρα ή ακολούθως σύστασης Ιατρού ή Διαιτολόγου

Συσκευασία

- Μπουκάλι 500ml



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: NUTRISON ENERGY 43504/31-05-2013
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

		ανά 100ml	ανά μερίδα (500 ml)
Ενέργεια	kJ	630	3150
	Kcal	150	750
Λιπαρά (35% Ενέργειας)	g	5,8	29
εκ των οποίων:			
Κορεσμένα	g	0,69	3,45
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	3,2	16
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	1,9	9,5
εκ των οποίων:			
EPA	mg	19,5	97,5
DHA	mg	13,5	67,5
Υδατάνθρακες (49% Ενέργειας)	g	18,5	92,5
Εκ των οποίων σάκχαρα:	g	1,2	6
Εκ των οποίων λακτόζη:	g	< 0,025	
Εδώδιμες ίνες (0% Ενέργειας)	g	0	0
Πρωτεΐνη (16% Ενέργειας)	g	6	30
Αλάτι	g	0,34	1,7
Βιταμίνες			
A	μg-RE	123	615
D	μg	2,55	12,75
E	mg-a-TE	2,04	10,2
K	μg	12	60
B1	mg	0,3	1,5
B2	mg	0,45	2,25
B3	mg-NE	1,4	7
B5	mg	0,63	3,15
B6	mg	0,45	2,25
Φυλλικό οξύ	μg	36	180
B12	μg	0,6	3
Βιοτίνη	μg	4,5	22,5
C	mg	19,5	97,5
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	135	675
K	mg	201	1005
Cl	mg	100	500
Ca	mg	120	600
P	mg	90	450
Mg	mg	31,2	156
Fe	mg	2,4	12
Zn	mg	1,5	7,5
Cu	mg	0,22	1,1
Mn	mg	0,23	1,15
F	mg	0,16	0,8
Mo	μg	16,5	82,5
Se	μg	8,55	42,75
Cr	μg	9	45
I	μg	21	105
Λοιπά			
Καρβοτενοειδή	mg	0,3	1,5
Χολίνη	mg	55,5	277,5
Οσμωτικότητα	mOsmol/l	400	2000

Nutrison Protein Intense

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Πολυμερές διάλυμα εντερικής διατροφής, πλήρους πρωτεΐνης, για αποκλειστική σίτιση μέσω καθετήρα ή στομίας. Σύνθεση με υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης που πληρούν τις πιο πρόσφατες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εντατική Φροντίδα.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Διατροφικά πλήρες θρεπτικό σκεύασμα
- **Θερμιδική πυκνότητα: 1,26 kcal/ml**
- Με το μίγμα πρωτεϊνών P4, της Nutricia
- Περιέχει τριγλυκερίδια μέσης αλύσου (MCTs)
- Με DHA/EPA
- **Χαμηλή ωσμωτικότητα** για υποστήριξη της γαστρεντερικής ανοχής
- Χαμηλή ποσότητα μονοσακχαριτών (0,14% κατ' όγκο)
- Ελεύθερο λακτόζη και γλουτένη
- Ελεύθερο εδώδιμων ινών

Ενδείξεις

- Για τη διαιτητική διαχείριση υποθρεψίας λόγω ασθένειας σε ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.
- Για τη διατροφική διαχείριση ασθενών σε σήψη, σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, εγκαυματίες, πολυτραυματίες
- Για την κάλυψη των πιο συχνών πρωτεϊνικών αναγκών (1,5g/kg σωματικού βάρους) βάσει συστάσεων για ασθενείς στην εντατική φροντίδα.¹

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας 1-12 ετών.
- Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαμία.

Σημαντική Σημείωση

- Για εντερική χρήση μόνο.
- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη

Προτεινόμενη δοσολογία

- 3-4 μπουκάλια την ημέρα ή ακολούθως σύστασης Ιατρού ή Διαιτολόγου

Συσκευασία

- Πτυσσόμενη φιάλη 500ml



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: NUTRISON PROTEIN INTENSE 105215/16-10-2020
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

1. Singer P, Berger MM, Van den Bergh G, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2009; 28(4): 387-400.

		ανά 100ml	ανά μερίδα (500 ml)
Ενέργεια	kJ	528	2640
	Kcal	126	630
Λιπαρά (35 Εν%)	g	4,9	24,5
εκ των οποίων:			
Κορεσμένα	g	1,3	6,5
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα	g	2,6	13
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	g	0,96	4,8
Υδατάνθρακες (33 Εν%)	g	10,4	52
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	0,8	4
Εκ των οποίων Λακτόζη	g	<0,025	<0,125
Εδώδιμες ίνες (0 Εν%)	g	0,09	0,45
Πρωτεΐνη (32 Εν%)	g	10	50
Αλάτι	g	0,29	1,45
Βιταμίνες			
A	μg	102	510
D	μg	1,72	8,6
E	mg-a-TE	1,63	8,15
K	μg	6,60	33
Θειαμίνη	mg	0,19	0,95
Ριβοφλαβίνη	mg	0,29	1,45
Νιασίνη	mg NE/EN	2,31	11,55
Παντοθενικό οξύ	mg	0,66	3,3
B6	mg	0,21	1,05
Φυλλικό οξύ	μg	33,1	165,5
B12	μg	0,52	2,6
Βιοτίνη	μg	5,00	25,0
C	mg	13,3	66,5
Μέταλλα/Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	116	580
K	mg	218	1090
Cl	mg	96,4	482
Ca	mg	75	375
P	mg	81,9	409,5
PO ₄	mg	251,0	1255,0
Mg	mg	22,0	110
Fe	mg	2,00	10,0
Zn	mg	1,45	7,25
Cu	μg	220	1100
Mn	mg	0,35	1,75
F	mg	0,13	0,65
Mo	μg	13,0	65,0
Se	μg	6,83	34,15
Cr	μg	8,30	41,5
I	μg	18,9	94,5
Άλλα			
Καροτενοειδή	mg	0,20	1,0
Χολίνη	mg	46,0	230
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l		275

Nutrison Peptisorb Plus HEHP

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειλόμενης σε ασθένεια, σε ασθενείς με δυσαπορρόφηση και/ή ατελή πέψη.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Υπερθερμιδικό, 1,5 kcal/ml
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, 7,5g/100ml, 20% Εν
- Ημιστοιχειακό, με βάση τα πεπτίδια
- Περιεκτικότητα σε MCT, 60%
- Χαμηλή ωσμωτικότητα, 445 mOsmol/l
- Διατροφικά πλήρες
- Ελεύθερο γλουτένης, λακτόζης
- Κατάλληλο για σίτιση μέσω καθετήρα/στομίας

Ενδείξεις

Για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειλόμενης σε ασθένεια, σε ασθενείς με **δυσαπορρόφηση και/ή ατελή πέψη**:

- Εξασθενημένη γαστρεντερική λειτουργία
- Ανεπάρκεια παγκρεατικών ενζύμων¹⁻⁴
- Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (Νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα)⁵⁻⁷
- Καρκίνος γαστρεντερικού σωλήνα ή παρακείμενων οργάνων με αποτέλεσμα εντερίτιδα από ακτινοβολία⁸⁻⁹
- Σύνδρομο βραχέως εντέρου¹⁰⁻¹¹
- Γαστρεντερικές διαταραχές σχετιζόμενες με τον HIV¹²
- Εντερικά συρίγγια¹³

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για βρέφη
- Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαμία.
- Περιέχει **γάλα και σόγια**

Σημαντική Σημείωση

- Για εντερική χρήση μόνο.
- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη
- Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά 1 έως 6 ετών

Προτεινόμενη δοσολογία

- 2-3 μπουκάλια την ημέρα ή ακολούθως σύστασης Ιατρού ή Διαιτολόγου

Συσκευασία

- Πτυσσόμενη φιάλη 500ml



Αρ.Γνωστοπ. ΕΟΦ: NUTRISON PEPTISORB PLUS HEHP 7117/29-06-2023Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

1. Meier R, et al. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2006; 25(2): 275-84. 2. Kumar A et al. Journal of clinical gastroenterology 2006; 40(5): 433-4. 3. Tiengou LE et al. JPEN Journal of parenteral and enteral nutrition 2006; 30(1): 1-5. 4. Garcia de Casasola G et al. Medicina clinica 2008; 130(13): 492-3. 5. Heuschkel RB et al. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition 2000; 31(1): 8-15. 6. O'Sullivan M, O'Morain C et al. Best practice & research Clinical gastroenterology 2006; 20(3): 561-73. 7. Smith P. World journal of gastroenterology 2008; 14(27): 4420-3. 8. Beer WH et al. The American journal of clinical nutrition 1985; 41(1): 85-91. 9. Boumou G. Surgery 1989; 105(5): 571-5. 10. Cosmes J, et al. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif) 1992; 8(6): 406-11. 11. de Luis Roman et al. European journal of clinical nutrition 2001; 55(12): 1048-52. 12. Ockenga J et al. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2006; 25(2): 319-29. 13. Bach AC et al., The American journal of clinical nutrition 1982; 36(5): 950-62.

		ανά 100ml	ανά συσκ. (500 ml)
Ενέργεια	kJ	631	3155
	kcal	150	750
Λιπαρά (30% Εν)	g	5	25
Εκ των οποίων			
Κορεσμένα	g	3,6	18
MCT	g	3	15
Υδατάνθρακες (50% Εν)	g	18,7	93,5
Εκ των οποίων			
Σάκχαρα	g	1,4	7
Λακτόζη	g	< 0,025	
Εδώδιμες Ίνες (0% Εν)	g	< 0,50	
Πρωτεΐνη (20% Εν)	g	7,5	37,5
Αλάτι	g	0,49	2,45
Βιταμίνες			
Βιτ. A	μg RE/ER	123	615
Βιτ. D	μg	2	10
Βιτ. E	mg(α-TE/ET)	1,94	9,7
Βιτ. K	μg	8,1	40,5
Θειαμίνη	mg	0,22	1,1
Ριβοφλαβίνη	mg	0,26	1,3
Νιασίνη	mg (2,95 mg NE/EN)		14,75
O,55			
Παντοθενικό οξύ	mg	0,8	4
Βιτ. B6	mg	0,26	1,3
Φολικό οξύ	μg	30	150
Βιτ. B12	μg	0,64	3,2
Βιοτίνη	μg	6	30
Βιτ. C	mg	15	75
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	197	985
K	mg	340	1700
Cl	mg	60	300
Ca	mg	97,2	486
P	mg	97	485
Mg	mg	30	150
Fe	mg	2,33	11,65
Zn	mg	1,7	8,5
Cu	mg	0,25	1,25
Mn	mg	0,36	1,8
F	mg	0,14	0,7
Mo	μg	16,9	84,5
Se	μg	9,40	47,0
Cr	μg	9,53	47,65
I	μg	18,5	92,5
Λοιπά			
Καρβοτενοειδή	mg	0,3	1,5
L-Καρνιτίνη	mg	15	75
Χολίνη	mg	55,5	277,5
Ταυρίνη	mg	15	75
Ωσμωτικότητα	mOsmol/l	445	
H2O	g water/100ml	77	

Nutrison Diason Energy HP

Περιγραφή

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειλόμενης σε ασθενείς με **αυξημένες ενεργειακές και πρωτεϊνικές ανάγκες**, όπου απαιτείται διατροφή **χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη**.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Υπερθερμιδικό, **1,5 kcal/ml**
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, **7,7g/100ml, 21% Εν**
- Με εδωδιμες ίνες, **1,5g/100ml, 2% Εν**
- Χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη (**<55**)¹
- Διατροφικά πλήρες
- Ελεύθερο γλουτένης, λακτόζης
- Κατάλληλο για σίτιση μέσω καθετήρα/στομίας

Ενδείξεις

Για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειλόμενης σε ασθενεία, σε ασθενείς με **αυξημένες ενεργειακές και πρωτεϊνικές ανάγκες**, όπου απαιτείται διατροφή **χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη**:

- Διαβήτη Τύπου 1 και Τύπου 2
- Μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη
- Νοσηλεύόμενοι ασθενείς με υπεργλυκαιμία²⁻⁴

Αντενδείξεις

- Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών
- Ασθενείς με γαλακτοζαμία
- Ασθενείς σε δίαιτα ελεύθερη εδωδιμων ινών
- Περιέχει **γάλα, σόγια και ψάρι**

Σημαντική Σημείωση

- Για εντερική χρήση μόνο
- Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη

Προτεινόμενη δοσολογία

- Ακολουθώντας σύσταση Ιατρού ή Διαιτολόγου

Συσκευασία

- Πτυσσόμενη φιάλη 1000ml



Αρ.Γνωστον. ΕΟΦ: NUTRISON DIASON ENERGY HP 5166/16-01-2024
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

¹Atkinson FS et al. Diabetes Care. 2008;31(22):281-3. ²Gosmanov AR et al. Curr Diab Rep. 2013;13(15):62. ³Pancorbo-Hidalgo PL et al. J Clin Nurs. 2001;10:482-90. ⁴Cook CB, et al. J Hosp Med. 2009;4:E7-e14.

		ανά 100ml	ανά συσκ. (1000 ml)
Ενέργεια	kJ	625	6250
	kcal	150	1500
Λιπαρά (46% Εν)	g	7,7	77
Εκ των οποίων			
Κορεσμένα	g	0,8	8
Μονοακόρεστα	g	4,6	46
Πολυακόρεστα	g	2,3	23
Εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA)	mg	20	200
Εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA)	mg	29,9	299
Υδατάνθρακες (31% Εν)	g	11,7	117
Εκ των οποίων			
Σάκχαρα	g	4,5	45
Λακτόζη	g	< 0,025	
Εδωδιμες ίνες (2% Εν)	g	1,5	15
Πρωτεΐνη (21% Εν)	g	7,7	77
Αλάτι	g	0,33	3,3
Βιταμίνες			
Βιτ. Α	μg	119	1190
Βιτ. D	μg	1	10
Βιτ. E	mg(a-TE/ET)	3,6	36
Βιτ. K	μg	7,7	77
Θειαμίνη	mg	0,23	2,3
Ριβοφλαβίνη	mg	0,24	2,4
Νιασίνη	mg (2,6mg NE/EN)	0,9	9
Παντοθενικό οξύ	mg	0,77	7,7
Βιτ. B6	mg	0,24	2,4
Φολικό οξύ	μg	42	420
Βιτ. B12	μg	0,72	7,2
Βιοτίνη	μg	5,8	58
Βιτ. C	mg	22	220
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	131	1310
K	mg	200	2000
Cl	mg	98	980
Ca	mg	82	820
P	mg	82	820
Mg	mg	37	370
Fe	mg	1,9	19
Zn	mg	1,4	14
Cu	mg	0,21	2,1
Mn	mg	0,38	3,8
F	mg	0,12	1,2
Mo	μg	12	120
Se	μg	8,7	87
Cr	μg	14	140
I	μg	16	160
Λοιπά			
Καρτονοειδή	mg	0,3	3
Χολίνη	mg	53	530
Όσμωτικότητα	mOsmol/l	395	

Αντλία Σίτισης Flocare® Infinity III

Περιγραφή

Φορητή αντλία εντερικής σίτισης, σχεδιασμένη για ελεγχόμενο ρυθμό χορήγησης της εντερικής διατροφής στη γαστρεντερική οδό. Διαθέτει νέο βελτιωμένο προγραμματισμό για την κάλυψη των αναγκών και διατροφικών απαιτήσεων του κάθε ασθενούς. Η ευκολία στη χρήση βελτιώνει το αίσθημα αυτοπεποίθησης και τη συμμόρφωση.

Γενικά χαρακτηριστικά

- Έγχρωμη οθόνη
- Αδιάβροχη
- Ανίχνευση φυσαλίδων αέρα με υπερήχους
- Αποθήκευση δεδομένων θεραπειάς για 30 ημέρες
- Μέγεθος: **149 x 119 x 49 mm**

Ροή

- Ανίχνευση απόφραξης στην ανοδική και καθοδική ροή
- Ρυθμός ροής: **1-600ml/h** με 1ml προσαύξηση
- Δοσολογία σίτισης: **1-3500ml** με 1ml προσαύξηση
- Ακρίβεια ροής **+/- 5%**, με το κατάλληλο σύστημα σίτισης Flocare Infinity

Ασφάλεια

- Ο δείκτης κατάστασης της αντλίας χρησιμοποιεί **χρώματα φωτεινού σηματοδότη** για να εμφανίζει καθαρά την κατάσταση της αντλίας, ορατή από απόσταση
- **Βελτιστοποιημένη στεριότητα** των συστημάτων σίτισης, μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης και ενισχύοντας την ασφάλεια των ασθενών
- Μη αεριζόμενο, μη εξαρτώμενο από τον αέρα σύστημα που **αποτρέπει πιθανή μόλυνση από τον αέρα ή το περιβάλλον του νοσοκομείου**
- Ευκόλος καθαρισμός, **πλένεται κάτω από τρεχούμενο νερό**

Μπαταρία

- Μπαταρία ιόντων λιθίου 3.7V DC 3200 mAh, χρόνος φόρτισης 6 ωρών
- **Διάρκεια μπαταρίας: 24 ώρες**



ΡΙνογαστρικοί καθετήρες Flocare® PUR

Περιγραφή

Ο ρινογαστρικός καθετήρας Flocare® είναι διαθέσιμος σε 110cm μήκος και 8 & 14 Charrières. Είναι εύκολος στην εισαγωγή και η θέση του μπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

- Με υλικά εύχρηστα και φιλικά προς το δέρμα.
- Βέλτιστη εκροή.

Ενδείξεις

- Η τοποθέτηση του ρινογαστρικού καθετήρα ενδείκνυται για βραχυχρόνια γαστρική σίτιση (μέγιστος χρόνος 6 με 8 εβδομάδες) και για αποσυμπίεση στομάχου.

Αντενδείξεις

- Ο ρινογαστρικός καθετήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με καθυστερημένη γαστρική κένωση ή/και κίνδυνο εισρόφησης.

Συστάσεις

Η σίτιση μέσω καθετήρα μπορεί να αρχίσει μόνο αφότου έχει επιβεβαιωθεί η σωστή θέση του (π.χ. από τη μέτρηση του pH του γαστρικού περιεχομένου). Ο καθετήρας ξεπλένεται πριν και μετά τη χορήγηση σίτισης και φαρμακευτικής αγωγής και τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα. Ο καθετήρας Flocare® πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 6-8 εβδομάδες.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Διάφανος καθετήρας πολυουρεθάνης με μπλε ακτινωτή διαβάθμιση σε εκατοστά.
- Ελεύθερο Latex & DEHP.
- Στρογγυλεμένη άκρη (έξοδος) για εύκολη εφαρμογή, με επιπλέον πλευρικές εξόδους.
- Συρμάτινος οδηγός επικαλυμμένος με σιλικόνη.

Συσκευασία

1 αποστειρωμένο σύστημα χορήγησης ανά blister.

Κωδικός Υλικού
15183



Ch 14-110 cm

Σωλήνες Σίτισης Flocare® Pack

Περιγραφή

Οι σωλήνες σίτισης Flocare® Pack ενδείκνυνται για τη σύνδεση του καθετήρα/της στομίας με τα θρεπτικά σκευάσματα Nutriini ή τους σάκους σίτισης Flocare®.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

- Τα πατενταρισμένα συστήματα σίτισης pack έχουν αποδειχθεί ότι ελαχιστοποιούν την επιμόλυνση σίτισης.
- Κατασκευάζονται με τους ασφαλέστερους πλαστικοποιητές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
- Ευδιάκριτες διαφορές από τα συστήματα παρεντερικής σίτισης.

Συστάσεις

Αλλάζονται κάθε 24 ώρες, ή όταν ο μέγιστος χρόνος χρήσης του σωλήνα σίτισης έχει επιτευχθεί.

Τα καπάκια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η επαφή του αέρα με τα σκευάσματα σίτισης.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Ελεύθερο Latex και DEHP.

Συσκευασία

1 αποστειρωμένο σύστημα χορήγησης ανά blister.

Κωδικός Υλικού

- Infinity [super™]: 15192



Σωλήνες Σίτισης Flocare® Universal

Περιγραφή

Οι σωλήνες σίτισης Flocare® Universal ενδείκνυνται για τη σύνδεση του καθετήρα/της στομίας με περιέκτες θρεπτικών σκευασμάτων, που είτε έχουν στενό στόμιο (26mm διάμετρος) ή ευρύ στόμιο (40mm διάμετρος).

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

- Κατασκευάζονται με τα ασφαλέστερα πλαστικά υλικά για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
- Ευδιάκριτες διαφορές από τα συστήματα της παρεντερικής σίτισης.

Συστάσεις

Αλλάζονται κάθε 24 ώρες, ή όταν ο μέγιστος χρόνος χρήσης του σωλήνα σίτισης έχει επιτευχθεί.

Τα καπάκια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η επαφή του αέρα με τα σκευάσματα σίτισης.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Ελεύθερο Latex και DEHP.

Συσκευασία

1 αποστειρωμένο σύστημα χορήγησης ανά blister.

Κωδικός Υλικού

- Infinity [super™]: 15197
- Βαρύτητας: 15195



**Σάκος εντερικής διατροφής
Flocare® Top Fill Reservoir
μαζί με σωλήνα σίτισης**

Περιγραφή

Σάκος εντερικής διατροφής Flocare®, διαθέσιμος σε 2 μεγέθη, που συνδέεται με καθετήρα/στομία. Είναι κατάλληλος για χορήγηση νερού, άλλων τύπων υγρών ή σίτισης.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

- Κατασκευάζονται με τα ασφαλέστερα πλαστικά υλικά για τους ανθρώπους και το περιβάλλον
- Ευδιάκριτες διαφορές από τα συστήματα της παρεντερικής σίτισης.

Συστάσεις

Αλλάζονται κάθε 24 ώρες, ή όταν ο μέγιστος χρόνος χρήσης του σωλήνα σίτισης έχει επιτευχθεί.

Τα καπάκια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η επαφή του αέρα με τα σκευάσματα σίτισης.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Ελεύθερο Latex και DEXR.

Συσκευασία

1 αποστειρωμένο σύστημα χορήγησης ανά blister.

Κωδικός Υλικού

- Infinity [super™]: 15194



ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ENLOCK ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Κωδικός Υλικού
15303)

Σημειώσεις

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Σημειώσεις

[illegible]

Σημειώσεις

[illegible]

Σημειώσεις

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Γραμμή επικοινωνίας

από σταθερό τηλέφωνο
χωρίς χρέωση

800 11 68600

από κινητό τηλέφωνο

210 6248 547

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας

Δίπλα στον ιατρό και στον ασθενή



Γραμμή φροντίδας



Κατ'οίκον παράδοση



Διατροφική συμβουλευτική

www.nutriciaprofessionals.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική διατροφή, τις διατροφικές μας λύσεις και τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνά μας επισκεφτείτε τη νέα μας ιστοσελίδα, αποκλειστικά για Επαγγελματίες Υγείας.



Τα προϊόντα της Nutricia είναι Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς και συστήνονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Το παρόν έντυπο απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας.

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION